

7

Traitement

Utilisation de la perméthrine, qui est disponible sous forme de crème topique avec une concentration de 5% pour les patients atteints et de 1% pour la prévention. Prendre un bain d'eau chaude en utilisant du savon, puis bien se sécher le corps afin d'appliquer le traitement sur le corps à l'aide d'un pinceaux. Parce que la gale se propage si facilement, votre médecin recommandera probablement un traitement pour tous les membres du ménage et autres contacts étroits, même s'ils ne montrent aucun signe d'infestation par la gale.



8

Les Références

- Centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis d'Amérique (CDC)
- Agence britannique de protection de la santé (HPA)
- Clinique Mayo
- Le service national de santé du Royaume-Uni (NHS)
- Site Web du Service d'information sanitaire du gouvernement australien (health.vic)
- Organisation mondiale de la santé (OMS)

6

Diagnostic de La Gale



Commencer par examiner la peau du patient et s'assurer de la présence d'éruptions cutanées et de terriers ayant l'apparence habituelle.

En cas de doute, il est possible de confirmer la présence de la gale par un examen microscopique en prélevant un échantillon de petits terriers se formant sur la peau au niveau de l'infection.



2030

معهد البحوث
والدراسات الاستشارية
Institute of Consulting
Research and Studies



وقاء

سلامة بلا وباء
معاً لوقف الداء



مركز السلامة وإدارة
المخاطر والأزمات (سيفكس)
THE CENTRE FOR
SAFETY RISK AND CRISIS
MANAGEMENT (SARCM)



وحدة التعليم الطبي المستمر
Continuous Medical Education & Training Unit

Que Savez-Vous de La Gale?



✉ icrs@uqu.edu.sa
🌐 www.uqu.edu.sa/icrs



icrsuqu



1 Définition de La Maladie



La scabbia est une maladie contagieuse causée par une scabia femelle (*Sarcoptes scabiae*), qui apparaît sous la forme de lésions cutanées dans certaines parties du corps, avec des démangeaisons sévères causées par la mite qui pond ses œufs sous la peau.

2 Les Personnes à Risque

La gale est présente partout dans le monde et affecte toutes les tranches d'âge, toutes les populations et tous les milieux socio-économiques. La gale peut-elle facilement se propager dans les lieux publics bondés, établissements de soins de santé, les crèches et les prisons.

3 Méthode de Transition

La gale se développe uniquement chez les peaux humaines et peut se transmettre d'une personne infectée à une autre via:

- Un contact cutané prolongé avec la gale
- L'utilisation de vêtements infecté par la gale
- L'utilisation de pinceaux infecté par la gale

4 Symptômes


- Les symptômes commencent par des démangeaisons et deviennent de plus en plus sévères le soir, surtout avant de se coucher, l'intensité des démangeaisons s'accroît avec la durée de la maladie.
- De petits granules rouges apparaissent à des endroits bien distinctifs, à savoir l'abdomen (autour du nombril et sur les côtés), entre les doigts de la main, sur les poignets, sur les aisselles, les cuisses et les organes génitaux. L'intensité des démangeaisons et la négligence du traitement peuvent entraîner des complications.





5 Gale Croûteuse (Norvégienne)


- La gale Croûteuse est un cas grave de gale qui affecte les personnes âgées généralement, celles qui ont une immunodéprimé et qui ne peuvent pas se frotter la peau à cause de leur paralysie ou de l'absence de sensation.
- Les corticostéroïdes se caractérisent par une gale normale avec des vésicules et une épaisse couche de croûtes sur la peau. Qui contient un très grand nombre d'acariens, environ 2 millions et est par conséquent extrêmement contagieuse.
- Les démangeaisons peuvent ne pas être présentes dans ce type de gale en raison du changement du statut immunitaire de la personne infectée.


4 Prévention générale de la maladie

 La transmission de cette maladie peut être évitée en évitant tout contact direct avec la peau de la personne infectée ou avec ses vêtements ou avec sa literie qu'il a utilisé. Il est généralement recommandé d'utiliser le traitement de la gale pour tous les membres de la même famille, en particulier pour ceux qui ont eu un contact permanent avec la peau des blessés tels que les mères.

 Tous les membres de la famille et les autres personnes vulnérables devraient être traités en même temps que la personne infectée afin de réduire les risques de réinfection.

 Les vêtements et les matelas de la personne infectée sont lavés 3 jours avant le traitement en utilisant un nettoyage à sec ou de l'eau chaude et séchés en utilisant des cycles d'air chaud.

 Les articles non lavables peuvent être nettoyés dans un sac en plastique étanche pendant plusieurs jours par semaine.

 Gale croûteuse: Les pièces utilisées par la personne souffrant de «gale» doivent être nettoyées le plus tôt possible en utilisant des méthodes de stérilisation complètes telles que l'utilisation de désinfectants. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des pesticides sous quelque forme que ce soit.

5 Les Références

- Centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis d'Amérique (CDC)
- Agence britannique de protection de la santé (HPA)
- Clinique Mayo
- Le service national de santé du Royaume-Uni (NHS)
- Site Web du Service d'information sanitaire du gouvernement australien (health.vic)
- Organisation mondiale de la santé (OMS)

icrs@uqu.edu.sa
www.uqu.edu.sa/icrs

icrsuqu



وقاء

سلامة بلا وباء
معاً لوقف الداء



مركز السلامة وإدارة
المخاطر والأزمات (سيفر)
THE CENTRE FOR
SAFETY RISK AND CRISIS
MANAGEMENT (SARCM)



وحدة التعليم والتدريب الطبي المستمر
Continuous Medical Education & Training Unit

Ligne Directrice de Traitement



1

Traitement



Utilisation de la perméthrine, qui est disponible sous forme de crème topique avec une concentration de 5% pour les patients atteints et de 1% pour la prévention. Prendre un bain d'eau chaude en utilisant du savon, puis bien se sécher le corps afin d'appliquer le traitement sur le corps à l'aide d'un pinceaux. Parce que la gale se propage si facilement, votre médecin recommandera probablement un traitement pour tous les membres du ménage et autres contacts étroits, même s'ils ne montrent aucun signe d'infestation par la gale.

2

Lors de l'utilisation de la perméthrine, considérez ce qui suit

- Il est préférable de l'utiliser la nuit pendant le sommeil et de partir pendant 8-14 heures.
- Se couper les ongles et appliquer un traitement sous les bords.
- Si une femme allaite elle doit retirer le médicament autour du mamelon avant l'allaitement.
- Il est nécessaire de traiter tout contact avec les blessures.
- Utiliser de l'ivermectine (selon les préconisations du médecin).
- Laver à 60 ° C, les vêtements et les draps utilisés par la personne infectée pendant au moins une semaine.
- Il est important que prendre un bain et utiliser un antiseptique.

3

Soins à domicile associés au traitement



Des démangeaisons aiguës peuvent persister après l'utilisation du traitement.

Les étapes suivantes peuvent réduire les démangeaisons. :

Soulagez la peau:

Plongez le corps dans de l'eau froide ou utilisez des compresses froides sur les zones enflammées pour soulager les démangeaisons.

Utilisez des crèmes palliatives

L'utilisation d'une solution de Calamine sans ordonnance qui peut surmonter la douleur associée aux démangeaisons et à la dermatite.

Utilisez un antihistaminiques:

Comme recommandé par le médecin, les antihistaminiques peuvent être utilisés dans les pharmacies sans ordonnance pour soulager les symptômes des allergies cutanées associées à la gale.