

جامعة أم القرى  
كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية

## الإحصاء الوصفي للاقتصاديين

(63041103-2)

الفصل الثاني

السنة الجامعية: 1439-1440 هـ

ملحق رقم 2 (هـ)

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة أم القرى  
كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية

قسم التأمين

توصيف المقرر

اسم المقرر :

الإحصاء الوصفي للاقتصاديين

الرمز 2-63041103

المستوى الدراسي الثاني

العام الدراسي

1437/1436 هـ

2016-2015 م

### نموذج توصيف المقرر

المؤسسة التعليمية: <b>جامعة أم القرى</b>	تاريخ التقرير:
الكلية: <b>كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية</b>	القسم: <b>قسم التأمين</b>

أ. تحديد المقرر ومعلومات عامة عنه

١. عنوان المقرر ورمزه: <b>الإحصاء الوصفي للاقتصاديين 2-63041103</b>
٢. الساعات المعتمدة: <b>2</b>
٣. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها (إذا كان المقرر يُقدم كمادة اختيارية ضمن برامج متعددة، يرجى الإشارة إلى ذلك بدلاً من تعداد البرامج): <b>قسم التأمين</b>
٤. اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس المقرر / <b>د. رمزي الدريسي</b>
٥. المستوى أو السنة التي يُقدم فيها هذه المقرر: <b>الثاني</b>
٦. المتطلب السابق لهذه المقرر (إن وجد): <b>لا يوجد</b>
٧. المتطلب المصاحب لهذه المقرر (إن وجد): <b>لا يوجد</b>
٨. مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: <b>داخل الجامعة</b>
٩. أنماط التعليم (ضع إشارة ✓ في المكان المناسب):
أ. الفصل الدراسي التقليدي <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 100
ب. التعليم المدمج (التقليدي والإلكتروني) <input type="checkbox"/>
ج. التعليم عن بعد <input type="checkbox"/>
د. المراسلة/النسبة المئوية <input type="checkbox"/>
هـ. طرق أخرى <input type="checkbox"/>
النسبة المئوية <input type="checkbox"/>
النسبة المئوية <input type="checkbox"/>
النسبة المئوية <input type="checkbox"/>
النسبة المئوية <input type="checkbox"/>
ملاحظات:

ب. الأهداف

١. ما الهدف الرئيس لهذا المقرر؟

- 1- أساسيات المهارات الإحصائية.
- 2- تطبيقات مقاييس النزعة والتشتت في مجال العلوم المالية والاقتصادية.
- 3- دراسة حدود العلاقة بين ظاهرتين.
- 4- أهمية استخدام الأرقام القياسية في دراسة ظواهر معينه.
- 5- اتخاذ بعض القرارات الخاصة بتحديد قناة الاستثمار الافضل.

٢. صف باختصار أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر. (مثلاً: زيادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة الانترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناءً على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي)  
المقرر هو ضمن برنامج جديد لقسم التأمين، وليس هناك حالياً بطبيعة الحال خطط يتم تنفيذها لتطوير المقرر.

ج. وصف المقرر

١. الوصف العام للمقرر (ملاحظة: ينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج): يهدف المقرر إلى تعرف الطالب بالمفاهيم الأساسية في علم الإحصاء، والأدوات والأساليب الرئيسية المستخدمة في الإحصاء الوصفي والمتمثلة في أساليب جمع وتنظيم البيانات وعرضها في جداول ورسوم بيانية وأشكال هندسية، وإجراء الحسابات اللازمة للوصول إلى المقاييس المختلفة التي تبرز الخصائص الأساسية للظاهرة، مثل مقاييس النزعة المركزية، وكذلك مقاييس التشتت، وغيرهما من المقاييس.

ساعات التدريس	توزيع الأسابيع	الموضوع
2	1	مفاهيم أساسية ( علم الإحصاء - اساليب جمع البيانات - العينات )
6	3	تبويب وعرض البيانات ( الجدولي - البياني )
8	4	مقاييس النزعة المركزية ( الوسط - الوسيط - المنوال - الوسط الهندسي - الوسط التوافقي الرباعيات - )
6	3	مقاييس التشتت ( المدى - نصف المدى - الانحراف المتوسط - الانحراف المعياري )
2	1	معامل الاختلاف النسبي وتطبيقاته
4	2	الارتباط والانحدار الخطي البسيط
2	1	الأرقام القياسية

شبكة الابحاث والدراسات الاقتصادية

# الاحصاء الوصفي

أعداد

الدكتور شرف الدين خليل

موقع الشبكة عبر شبكة الانترنت

[www.rr4ee.net](http://www.rr4ee.net)

مكتبة

شبكة الابحاث والدراسات الاقتصادية

## الفصل الأول التعريف بعلم الإحصاء

### 1/1 مقدمة

من المفاهيم الشائعة بين الناس عن الإحصاء، ما هي إلا أرقام وبيانات رقمية فقط، كأعداد السكان، وأعداد المواليد، وأعداد الوفيات، وأعداد المزارعين، وأعداد المزارع، وخلافه، ومن ثم ارتبط مفهوم الناس عن الإحصاء بأنه عد أو حصر الأشياء والتعبير عنها بأرقام، وهذا هو المفهوم الخدود لعلم الإحصاء، ولكن الإحصاء كعلم، هو الذي يهتم بطرق جمع البيانات، وتبويبها، وتلخيصها بشكل يمكن الاستفادة منها في وصف البيانات وتحليلها للوصول إلى قرارات سليمة في ظل ظروف عدم التأكد.

### 2/1 وظائف علم الإحصاء

من التعريف السابق يمكن تحديد أهم وظائف علم الإحصاء في الآتي:

- 1- وصف البيانات Data Description
- 2- الاستدلال الإحصائي Statistical Inference
- 3- التنبؤ Forecasting

#### أولاً: وصف البيانات

تعتبر طريقة جمع البيانات وتبويبها وتلخيصها من أهم وظائف علم الإحصاء، إذ لا يمكن الاستفادة من البيانات الخام، ووصف الظواهر المختلفة محل الاهتمام، إلا إذا تم جمع البيانات وعرضها في شكل جدي، أو بياني من ناحية، وحساب بعض المؤشرات الإحصائية البسيطة التي تدلنا على طبيعة البيانات من ناحية أخرى.

#### ثانياً: الاستدلال الإحصائي

وهو أيضاً من أهم الوظائف المستخدمة في مجال البحث العلمي، ويستند الاستدلال الإحصائي على فكرة اختيار جزء من المجتمع يسمى عينة بطريقة علمية مناسبة، بغرض استخدام بيانات هذه العينة في التوصل إلى نتائج، يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة، ومن ثم يهتم الاستدلال الإحصائي بموضوعين هما:

- 1- التقدير Estimate: وفيه يتم حساب مؤشرات من بيانات العينة تسمى إحصاء Statistics تستخدم كتقدير لمؤشرات المجتمع وتسمى معالم Parameters، ويطلق على المقاييس الإحصائية المحسوبة من بيانات العينة في هذه الحالة بالتقدير بنقطة Point Estimate، كما يمكن أيضاً استخدام المقاييس الإحصائية المحسوبة من بيانات العينة في تقدير المدى الذي يمكن أن يقع داخله معلمة المجتمع باحتمال معين، ويسمى ذلك التقدير بفترة Interval Estimate.

2- اختبارات الفروض Tests of Hypotheses: وفيه يتم استخدام بيانات العينة للوصول إلى قرار علمي سليم بخصوص الفروض المحددة حول معالم المجتمع.

### ثالثاً: التنبؤ

وفيه يتم استخدام نتائج الاستدلال الإحصائي، والتي تدلنا على سلوك الظاهرة في الماضي في معرفة ما يمكن أن يحدث لها في الحاضر والمستقبل. وهناك العديد من الأساليب الإحصائية المعروفة التي تستخدم في التنبؤ، ومن أبسطها أسلوب الاتجاه العام، وهي معادلة رياضية يتم تقدير معاملاتها باستخدام بيانات العينة، ثم بعد ذلك استخدام المعادلة المقدرة في التنبؤ بما يمكن أن يحدث للظاهرة في المستقبل.

## 3/1 أنواع البيانات وطرق قياسها

من التعريف السابق لعلم الإحصاء، يلاحظ أنه العلم الذي يهتم بجمع البيانات Data، ونوع البيانات، وطريقة قياسها من أهم الأشياء التي تحدد التحليل الإحصائي المستخدم، وللبيانات أنواع تختلف في طريقة قياسها، ومن الأمثلة على ذلك: بيانات النوع (ذكور Male - إناث Female)، وبيانات تقدير الطالب ( $A^+ - A - B^+ - B - C^+ - C - D^+ - D$ )، وبيانات عن درجة الحرارة اللازمة لحفظ الدجاج فترة زمنية معينة، وبيانات عن حجم الإنفاق العائلي بالآلاف ريال خلال الشهر. ومن هذه الأمثلة نجد أن بيانات النوع غير رقمية، بينما بيانات تقدير الطالب بيانات رقمية موضوعة في شكل مستويات أو فئات، أما بيانات كل من درجة الحرارة، وحجم الإنفاق العائلي فهي بيانات رقمية، ومن ثم يمكن تقسيم البيانات إلى مجموعتين هما:

1- البيانات الوصفية Qualitative Data

2- البيانات الكمية Quantitative Data

### أولاً: البيانات الوصفية

هي بيانات غير رقمية، أو بيانات رقمية مرتبة في شكل مستويات أو في شكل فئات رقمية، ومن ثم تقاس البيانات الوصفية بمعاييرين هما:

أ- بيانات وصفية مقاسة بمعيار اسمي Nominal Scale: وهي بيانات غير رقمية تتكون من مجموعات متنافية، كل مجموعة لها خصائص تميزها عن المجموعة الأخرى، كما أن هذه المجموعات لا يمكن المقاضلة بينها، ومن الأمثلة على ذلك:

- النوع: متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار اسمي " ذكر - أنثى " .
  - الحالة الاجتماعية: متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار اسمي " متزوج - أعزب - أرمل - مطلق " .
  - أصناف التمور: متغير وصفي يقاس بياناته بمعيار اسمي " برحي - خلاص - سكري - .... " .
  - الجنسية: متغير وصفي يقاس بياناته بمعيار اسمي " سعودي - غير سعودي "
- وهذا النوع من البيانات يمكن تكويد مجموعاته بأرقام، فمثلاً الجنسية يمكن إعطاء الجنسية "سعودي" الكود (1)، والجنسية "غير سعودي" الكود (2)

ب- بيانات وصفية مقاسة بمقياس ترتيبي Ordinal Scales: وتتكون من مستويات، أو فئات يمكن ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً، ومن الأمثلة على ذلك:

- تقدير الطالب: متغير وصفي تقاس بياناته بمقياس ترتيبي "D-D<sup>+</sup>-C-C<sup>+</sup>-B-B<sup>+</sup>-A-A<sup>+</sup>"
- المستوى التعليمي: متغير وصفي تقاس بياناته بمقياس ترتيبي "أمي - يقرأ ويكتب - ابتدائية - متوسطة - ثانوية - جامعية - أعلى من جامعية"
- تركيز خلاصات الصوديوم المستخدم في حفظ لحوم الدجاج من البكتيريا: متغير وصفي ترتيبي يقاس بياناته بمقياس ترتيبي "0% - 5% - 10% - 15%"
- فئات الدخل العائلي في الشهر بالريال " <5000 ، 5000-10000 ، 10000-15000 ، 15000-20000 ، >20000 ."

### ثانياً: البيانات الكمية

هي بيانات يعبر عنها بأرقام عددية تمثل القيمة الفعلية للظاهرة، وتنقسم إلى قسمين هما:

- أ- بيانات فترة Interval Data: وهي بيانات رقمية، تقاس بمقدار بعدها عن الصفر، أي أن للصفر دلالة على وجود الظاهرة، ومن أمثلة ذلك:
    - درجة الحرارة: متغير كمي تقاس بياناته بمقياس بعدي، حيث أن درجة الحرارة "0" ليس معناه انعدام الظاهرة، ولكنه يدل على وجود الظاهرة.
    - درجة الطالب في الاختبار: متغير كمي يقاس بياناته بمقياس بعدي، حيث حصول الطالب على الدرجة "0" لا يعني انعدام مستوى الطالب.
  - ب- بيانات نسبية Ratio Data: هي متغيرات كمية، تدل القيمة "0" على عدم وجود الظاهرة ومن الأمثلة على ذلك:
    - إنتاجية الفدان بالطن/هكتار.
    - المساحة المزرعة بالأعلاف بالدونم.
    - كمية الألبان التي تنتجها البقرة في اليوم.
    - عدد مرات استخدام المزرعة لنوع معين من الأسمدة.
    - عدد الوحدات المعيبة من إنتاج المزرعة.
- ويلاحظ أن بيانات الفترة لا يمكن إخضاعها للعمليات الحسابية مثل عمليات الضرب والقسمة، بينما يمكن فعل ذلك مع البيانات النسبية.

## 4/1 طرق جمع البيانات

تعتبر طريقة جمع البيانات من أهم المراحل التي يعتمد عليها البحث الإحصائي، كما أن جمع البيانات بأسلوب علمي صحيح، يترتب عليه الوصول إلى نتائج دقيقة في التحليل،



ولدراسة طرق جمع البيانات، يجب الإلمام بالنقاط التالية:

- 1- مصادر البيانات.
- 2- أسلوب جمع البيانات.
- 3- أنواع العينات
- 4- وسائل جمع البيانات.

## 1/4/1 مصادر جمع البيانات

هناك مصدرين للحصول منها على البيانات هما:

- 1- المصادر الأولية.
- 2- المصادر الثانوية.

**أولاً: المصادر الأولية:** وهي المصادر التي نحصل منها على البيانات بشكل مباشر، حيث يقوم الباحث نفسه بجمع البيانات من المفردة محل البحث مباشرة، فعندما يهتم الباحث بجمع بيانات عن الأسرة، يقوم بإجراء مقابلة مع رب الأسرة، ويتم الحصول منه مباشرة على بيانات خاصة بأسرته، مثل بيانات المنطقة التابع لها، والحي الذي يسكن فيه، والجنسية، والمهنة، والدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، والمستوى التعليمي، ... وهكذا. ويتميز هذا النوع من المصادر بالدقة والثقة في البيانات، لأن الباحث هو الذي يقوم بنفسه بجمع البيانات من المفردة محل البحث مباشرة، ولكن أهم ما يعاب عليها أنها تحتاج إلى وقت ومجهود كبير، ومن ناحية أخرى أنها مكلفة من الناحية المادية.

**ثانياً: المصادر الثانوية:** وهي المصادر التي نحصل منها على البيانات بشكل غير مباشر، بمعنى آخر يتم الحصول عليها بواسطة أشخاص آخرين، أو أجهزة، وهيئات رسمية متخصصة، مثل نشرات وزارة الزراعة، ونشرات مصلحة الإحصاء، ونشرات منظمة الأغذية " الفاو".... وهكذا.

ومن مزايا هذا النوع من المصادر، توفير الوقت والجهد والمال، إلا أن درجة ثقة الباحث فيها ليست بنفس الدرجة في حالة المصادر الأولية.

## 2/4/1 أسلوب جمع البيانات

يتحدد الأسلوب المستخدم في جمع البيانات، حسب الهدف من البحث، وحجم المجتمع محل البحث، وهناك أسلوبين لجمع البيانات هما:

- 1- أسلوب الحصر الشامل.
- 2- أسلوب المعاينة.

**أولاً: أسلوب الحصر الشامل:** يستخدم هذا الأسلوب إذا كان الغرض من البحث هو حصر جميع مفردات المجتمع، وفي هذه الحالة يتم جمع بيانات عن كل مفردة من مفردات المجتمع بلا استثناء، كحصر جميع المزارع التي تنتج التمور، أو حصر البنوك الزراعية في المملكة، ويتميز أسلوب الحصر الشامل بالشمول وعدم التحيز، ودقة النتائج، ولكن يعاب عليه أنه يحتاج إلى الوقت والمجهود، والتكلفة العالية.

ثانياً: أسلوب المعاينة: يعتم هذا الأسلوب على معاينة جزء من المجتمع محل الدراسة، يتم اختياره بطريقة علمية سليمة، ودراسته ثم تعميم نتائج العينة على المجتمع، ومن ثم يتميز هذا الأسلوب بالآتي:

- 1- تقليل الوقت والجهد.
- 2- تقليل التكلفة.
- 3- الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً، وخاصة إذا جمعت البيانات من خلال استمارة استبيان.
- 4- كما أن أسلوب المعاينة يفضل في بعض الحالات التي يصعب فيها إجراء حصر شامل، مثل معاينة دم المريض، أو إجراء تعداد لعدد الأسماك في البحر، أو معاينة اللبيمات الكهربائية. ولكن يعاب على أساليب المعاينة: أن النتائج التي تعتمد على هذا الأسلوب أقل دقة من نتائج أسلوب الحصر الشامل، وخاصة إذا كانت العينة المختارة لا تمثل المجتمع تمثيلاً جيداً.


### 1/4/3 أنواع العينات

لكي نستعرض أنواع العينات، يتم أولاً تحديد الفرق بين مجتمع الدراسة، والعينة المسحوبة من هذا المجتمع.

- أ- المجتمع: هو مجموعة من المفردات التي تشترك في صفات، وخصائص محددة، ومجتمع الدراسة هو الذي يشمل جميع مفردات الدراسة، أي هو الكل الذي نرغب دراسته، مثل مجتمع مزارع إنتاج الدواجن، أو مجتمع طلاب الصف الثالث الثانوي.
- ب- العينة: هو جزء من المجتمع يتم اختياره بطرق مختلفة بغرض دراسة هذا المجتمع.

شكل رقم (1)

الفرق بين المجتمع والعينة



عينة الدراسة


مجتمع الدراسة

ويتوقف نجاح استخدام أسلوب المعاينة على عدة عوامل هي:

- 1- كيفية تحديد حجم العينة. 2- طريقة اختيار مفردات العينة 3- نوع العينة المختارة.

ويمكن تقسيم العينات وفقاً لأسلوب اختيارها إلى نوعين هما:

- أ- العينات الاحتمالية
- ب- العينات غير الاحتمالية



شكل رقم (2)

### أولاً: العينات الاحتمالية

هي العينات التي يتم اختيار مفرداتها وفقاً لقواعد الاحتمالات، بمعنى آخر هي التي يتم اختيار مفرداتها من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية، بهدف تجنب التحيز الناتج عن اختيار المفردات، ومن أهم أنواع العينات الاحتمالية، ما يلي:

- أ- العينة العشوائية البسيطة Simple Random Sample.
- ب- العينة العشوائية الطباقية Stratified Random Sample.
- ت- العينة العشوائية المنتظمة Systematic Random Sample.
- ث- العينة العنقودية أو المتعددة المراحل Cluster Sample.

### ثانياً: العينات غير الاحتمالية

هي التي يتم اختيار مفرداتها بطريقة غير عشوائية، حيث يقوم الباحث باختيار مفردات العينة بالصورة التي تحقق الهدف من المعاينة، مثل اختيار عينة من المزارع التي تنتج التمور من النوع السكري، وأهم أنواع العينات غير الاحتمالية:

- أ- العينة العمدية Judgmental Sample
- ب- العينة الحصصية Quota Sample

## الفصل الثاني طرق عرض البيانات

### 1/2 مقدمة

الخطوة التالية بعد جمع البيانات في مجال الإحصاء الوصفي، هو تبويب البيانات وعرضها بصورة يمكن الاستفادة منها في وصف الظاهرة محل الدراسة، من حيث تمركز البيانات، ودرجة تجانسها. وهناك طريقتين لعرض البيانات هما:

1- عرض البيانات جدولياً.

2- عرض البيانات بيانياً.

### 2/2 عرض البيانات جدولياً

يمكن عرض البيانات في صورة جدول تكراري، ويختلف شكل الجدول طبقاً لنوع البيانات، وحسب عدد المتغيرات، وفيما يلي عرض بيانات متغير (وصفي أو كمي) في شكل جدول تكراري بسيط.

#### 1/2/2 عرض بيانات المتغير الوصفي في شكل جدول تكراري بسيط

إذا كنا بصدد دراسة ظاهرة ما تحتوي على متغير وصفي واحد، فإنه يمكن عرض بياناته في شكل جدول تكراري بسيط، وهو جدول يتكون من عمودين، أحدهما به مستويات (مجموعات) المتغير، والثاني به عدد المفردات (التكرارات) لكل مستوى (مجموعة).

والمثال التالي يبين لنا كيف يمكن تبويب البيانات الوصفية الخام في شكل جدول تكراري.

#### مثال (1-2)

فيما يلي بيانات عينة من 40 مزرعة عن نوع التمر الذي تنتجه المزرعة.

سكري	خلاص	برحي	خلاص	برحي	خلاص	برحي	سكري
برحي	سكري	برحي	صقعي	خلاص	برحي	برحي	برحي
صقعي	برحي	سكري	خلاص	برحي	برحي	صقعي	صقعي
برحي	خلاص	برحي	سكري	نبوت سيف	صقعي	نبوت سيف	صقعي
خلاص	برحي	صقعي	نبوت سيف	سكري	برحي	صقعي	خلاص

والمطلوب:

1- ما هو نوع المتغير؟، وما هو المعيار المستخدم في قياس البيانات؟.

2- اعرض البيانات في شكل جدول تكراري.

3- كون التوزيع التكراري النسبي.

4- علق على النتائج.

## الحل

1- نوع التمر (سكري - خلاص - برحي - صقعي - نبوت سيف) متغير وصفي، تقاس بياناته بمعيار اسمي.

2- لعرض البيانات في شكل جدول تكراري، يتم إتباع الآتي:

- تكوين جدول تفريغ البيانات:

وهو جدول يحتوي على علامات إحصائية، كل علامة تعبر عن تكرار للمجموعة التي ينتمي إليها نوع التمر الذي تنتجه المزرعة، وكل خمس علامات تكون حزمة إحصائية، كما هو مبين بالجدول التالي:

جدول تفريغ البيانات

نوع التمر	العلامات الإحصائية	عدد المزارع (التكرارات)
سكري		5
خلاص		10
برحي		13
صقعي		8
نبوت سيف		4
<b>Sum</b>		<b>40</b>

- تكوين الجدول التكراري.

وهو نفس الجدول السابق، باستثناء العود الثاني، ويأخذ الصورة التالية:

جدول رقم (1-2)

التوزيع التكراري لعينة حجمها 40 مزرعة حسب نوع التمر الذي تنتجه

نوع التمر	عدد المزارع (التكرارات) (f)	التوزيع التكراري النسبي
سكري	5	$\left(\frac{5}{40}\right) = 0.125$
خلاص	10	$\left(\frac{10}{40}\right) = 0.25$
برحي	13	$\left(\frac{13}{40}\right) = 0.325$
صقعي	8	$\left(\frac{8}{40}\right) = 0.20$
نبوت سيف	4	$\left(\frac{4}{40}\right) = 0.10$
<b>Sum</b>	<b>40</b>	<b>1.00</b>

المصدر: بيانات افتراضية.

### 3- التوزيع التكراري النسبي:

يحسب التكرار النسبي بقسمة تكرار المجموعة على مجموع التكرارات، أي أن:

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار المجموعة}}{\text{مجموع التكرارات (n)}} = \left( \frac{f}{\sum f} \right) \quad (1-2)$$

والعمود الثالث في الجدول رقم (1-2) يعرض التكرار النسبي للمزارعين حسب نوع التمر. 4- التعليق: من الجدول رقم (1-2) يلاحظ أن نسبة المزارع التي تنتج النوع "برحي" في العينة هي 32.5% وهي أكبر نسبة مما يدل على أن النمط الشائع في إنتاج التمور هو ذلك النوع، بينما نجد أن نسبة المزارع التي تنتج النوع "نبوت سيف" حوالي 10.0% وهي أقل نسبة.

### مثال (2-2)

فيما يلي بيانات عن المستوى التعليمي لعينة من 50 فرد.

متوسط	يقراً ويكتب	ثانوي	متوسط	ثانوي	أعلى من جامعي	متوسط	ابتدائي
يقراً ويكتب	متوسط	ثانوي	ثانوي	ثانوي	ثانوي	ابتدائي	متوسط
ابتدائي	ثانوي	يقراً ويكتب	جامعي	ثانوي	ابتدائي	يقراً ويكتب	ثانوي
متوسط	ابتدائي	متوسط	ثانوي	ثانوي	متوسط	جامعي	متوسط
ثانوي	متوسط	ابتدائي	ثانوي	ثانوي	ابتدائي	ثانوي	ثانوي
جامعي	ثانوي	جامعي	ابتدائي	ثانوي	أعلى من جامعي	ثانوي	ثانوي
متوسط	يقراً ويكتب						

والمطلوب: 1- اعرض البيانات في شكل جدول تكراري.

2- كون التوزيع التكراري النسبي، ثم علق على النتائج.

### الحل

1- عرض البيانات في شكل جدول تكراري:

المستوى التعليمي (يقراً ويكتب- ابتدائي- متوسط- ثانوي- جامعي- أعلى من جامعي) متغير

وصفي ترتيبي، ويمكن عرض البيانات أعلاه في شكل جدول تكراري يتباع الآتي:

- تكوين جدول تفرغ البيانات:

#### جدول تفرغ البيانات

عدد الأفراد (التكرارات)	العلامات الإحصائية	المستوى التعليمي
6		يقراً ويكتب
10		ابتدائي
12		متوسط
15		ثانوي
5		جامعي
2		أعلى من جامعي
50		Sum

• تكوين الجدول التكراري:

جدول رقم (2-2)

التوزيع التكراري لعينة حجمها 50 فرد حسب المستوى التعليمي

المستوى التعليمي	عدد الأفراد (التكرارات) (f)	التوزيع التكراري النسبي
يقرأ ويكتب	6	0.12
ابتدائي	10	0.20
متوسط	12	0.24
ثانوي	15	0.30
جامعي	5	0.10
أعلى من جامعي	2	0.04
<b>Sum</b>	<b>50</b>	<b>1.00</b>

المصدر: بيانات عينة

2- تكوين التوزيع التكراري النسبي.

بتطبيق المعادلة رقم (2-1) يمكن حساب التكرارات النسبية، والعمود الثالث في الجدول رقم (2-2) بين هذا التوزيع،

ومن التوزيع النسبي يلاحظ أن حوالي 30% من أفراد العينة ممن لديهم مؤهل ثانوي، بينما يكون نسبة الأفراد ممن لديهم مؤهل اقل من الثانوي (متوسط، ابتدائي، يقرأ ويكتب) أكثر من 5%، أما نسبة الأفراد الحاصلين على مؤهل أعلى من جامعي حوالي 4% وهي أقل نسبة.

ملاحظات على الجدول

عند تكوين جدول ما لعرض البيانات، يجب مراعاة الآتي:

- 1- كتابة رقم للجدول.
- 2- كتابة عنوان للجدول.
- 3- لكل عمود من أعمدة الجدول عنوان يدل على محتواه.
- 4- يجب كتابة مصدر البيانات في الجدول.

2/2/2 عرض بيانات المتغير الكمي في شكل جدول تكراري بسيط

بنفس الأسلوب السابق المتبع في تكوين جدول تكراري، يمكن أيضا عرض بيانات المتغير الكمي في شكل جدول تكراري بسيط، ويتكون هذا الجدول من عمودين، الأول يحتوي على فئات تصاعديّة للقراءات التي يأخذها المتغير، والثاني يشمل التكرارات أو عدد المفردات التي تنتمي قراءاتها للفئة المناسبة لها، والمثال التالي يبين كيف يمكن عرض البيانات الكمية ببيانيا.

مثال (3-2)

فيما يلي بيانات درجات 70 طالب في الاختبار النهائي لمقرر مادة الإحصاء التطبيقي.

56	65	70	65	55	60	66	70	75	56
60	70	61	67	61	71	67	62	71	66
68	72	57	68	72	69	57	71	69	75
72	62	67	73	58	63	66	73	63	65
58	73	74	76	74	80	81	60	74	58
76	82	77	83	77	85	91	78	94	72
79	64	57	79	55	87	64	88	78	62

والمطلوب:

- 1- كون التوزيع التكراري لدرجات الطلاب.
- 2- كون التوزيع التكراري النسبي.
- 3- ما هو نسبة الطلاب الحاصلين على درجة ما بين 70 إلى أقل من 80؟
- 4- ما هو نسبة الطلاب الحاصلين على درجة أقل من 70 درجة؟
- 5- ما هو نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 80 أو أكثر؟

الحل

1- تكوين التوزيع التكراري:

درجة الطالب في الاختبار متغير كمي مستمر، ولكي يتم تبويب البيانات في شكل جدول تكراري، يتم اتباع الآتي:

• حساب المدى  $Range(R)$

$$Range = Maximum - Minimum$$

$$R = 94 - 55 = 39$$

• تحديد عدد الفئات  $(C)$ :

تحدد عدد الفئات وفقاً لاعتبارات منها: رأي الباحث، والهدف من البحث، وحجم البيانات، ويرى كثيراً من الباحثين أن أفضل عدد للفئات يجب أن يتراوح بين 5 إلى 15، بفرض أن عدد الفئات هو 8 فئات، أي أن:  $(C=8)$ .

• حساب طول الفئة  $(L)$ :

$$L = \frac{Range}{Classes} = \frac{R}{C} = \frac{39}{8} = 4.875 \approx 5$$

• تحديد الفئات:

الفئة تبدأ بقيمة تسمى الحد الأدنى، وتنتهي بقيمة تسمى الحد الأعلى، ومن ثم نجد أن:

- الحد الأدنى للفئة الأولى هو أقل قراءة (درجة) أي أن الحد الأدنى للفئة الأولى = 55

الحد الأعلى للفئة الأولى = الحد الأدنى + طول الفئة =  $55 + L = 60 = 55 + 5$

إذا الفئة الأولى هي: "55 to less than 60" وتقرأ "من 55 إلى أقل من 60"

\_ الحد الأدنى للفئة الثانية = الحد الأعلى للفئة الأولى = 60

الحد الأعلى للفئة الثانية = الحد الأدنى للفئة + طول الفئة =  $60 + 5 = 65$

إذا الفئة الثانية هي: "60 to less than 65" وتقرأ "من 60 إلى أقل من 65"

- وب نفس الطريقة يتم تكوين حدود الفئات الأخرى، وهي:



الفئة الثالثة : 65 to les than 70      الفئة الرابعة : 70 to les than 75  
 الفئة الخامسة : 75 to les than 80      الفئة السادسة : 80 to les than 85  
 الفئة السابعة : 85 to les than 90      الفئة الثامنة : 90 to les than 95

ويمكن كتابة الفئات بأشكال مختلفة كما هو مبين بجدول تفريغ البيانات:

- تكوين جدول تفريغ البيانات:

جدول تفريغ البيانات

الدرجة			العلامات الإحصائية	عدد الطلاب (التكرارات)
فئات	فئات	فئات		
55 to les than 60	55 – 60	55-		10
60 to les than 65	60 – 65	60-		12
65 to les than 70	65 – 70	65-		13
70 to les than 75	70 – 75	70-		16
75 to les than 80	75 – 80	75-		10
80 to les than 85	80 – 85	80-		4
85 to les than 90	85 – 90	85-		3
90 to les than 95	90 - 95	90-95		2
<b>Sum</b>				<b>70</b>

- تكوين الجدول التكراري:

جدول رقم (2-3)

التوزيع التكراري لعدد 70 طالب حسب درجاتهم في اختبار مقرر الإحصاء

فئات الدرجة	عدد الطلاب (التكرارات) (f)	التكرار النسبي
55 – 60	10	0.143
60 – 65	12	0.171
65 – 70	13	0.186
70 – 75	16	0.229
75 – 80	10	0.143
80 – 85	4	0.057
85 – 90	3	0.043
90 – 95	2	0.028
<b>Sum</b>	<b>70</b>	<b>1.00</b>

المصدر: بيانات نتيجة العام 1426هـ

- 2- التوزيع التكراري النسبي:

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{f}{n}$$

والعمود الثالث في الجدول رقم (2-3) يبين التكرار النسبي.

3- نسبة الطلاب الحاصلين على درجات ما بين 70 إلى أقل من 80 هو مجموع التكرارين النسبيين للفئتين الرابعة والخامسة:

$$0.229 + 0.143 = 0.372 = \text{نسبة الطلاب الحاصلين على درجات ما بين ( 70 , 80 )}$$

أي حوالي 37.2% من الطلاب حصلوا على درجات ما بين ( 70 , 80 ) .

4- نسبة الطلاب الحاصلين على درجات أقل من 70، هو مجموع التكرارات النسبية للفئات الأولى والثانية، والثالثة:

$$0.143 + 0.171 + 0.186 = 0.5 = \text{نسبة الطلاب الحاصلين على درجة أقل من 70}$$

أي أن حوالي 50% من الطلاب حصلوا على درجة أقل من 70 درجة

5- نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 80 أو أكثر، هو مجموع التكرارات النسبية للفئات الثلاث الأخيرة:

$$0.057 + 0.043 + 0.028 = 0.128 = \text{نسبة الطلاب الحاصلين على درجات 80 أو أكثر}$$

أي أن حوالي 12.8% من الطلاب حصلوا على درجة 80 أو أكثر.

## 3/2 العرض البياني للبيانات الكمية

العرض البياني للبيانات، هو أحد طرق التي يمكن استخدامها في وصف البيانات، من حيث شكل التوزيع ومدى تركز البيانات، وفي كثير من النواحي التطبيقية يكون العرض البياني أسهل وأسرع في وصف الظاهرة محل الدراسة، وتختلف طرق عرض البيانات بيانيا حسب نوع البيانات المبوبة في شكل جدول تكراري، وفيما يلي عرض للأشكال البيانية المختلفة.

### 1/3/2 المدرج التكراري Histogram

المدرج التكراري هو التمثيل البياني للجدول التكراري البسيط الخاص بالبيانات الكمية المتصلة، وهو عبارة عن أعمدة بيانية متلاصقة، حيث تمثل التكرارات على المحور الرأسي، بينما تمثل قيم المتغير ( حدود الفئات) على المحور الأفقي، ويتم تمثيل كل فئة بعمود، ارتفاعه هو تكرار الفئة، وطول قاعدته هو طول الفئة.

مثال (2-4)

فيما يلي التوزيع التكراري لأوزان عينة من الدواجن بالجرام، حجمها 100 اختيرت من أحد المزارع بعد 45 يوم.

الوزن	600-	620-	640-	660-	680-	700-720	Sum
عدد الدجاج	10	15	20	25	20	10	100

والمطلوب:

1- ما هو طول الفئة؟

- 2- ارسم المدرج التكراري.  
3- ارسم المدرج التكراري النسبي، ثم علق على الرسم.

الحل

1- طول الفئة (L)

طول الفئة = الحد الأعلى للفئة - الحد الأدنى للفئة

$$L = upper - Lower$$

(٣-٢)

$$L = 620 - 600 = 640 - 620 = \dots = 720 - 700 = 20$$

إذا طول الفئة = 20


2- رسم المدرج التكراري.

لرسم المدرج التكراري يتم إتباع الخطوات التالية:

- رسم محوران متعامدان، الرأسى ويمثل التكرارات، الأفقى ويمثل الأوزان.
  - كل فئة تمثل بعمود ارتفاعه هو تكرار الفئة، وطول قاعدته هو طول الفئة.
  - كل عمود يبدأ من حيث انتهى به عمود الفئة السابقة.
- والشكل (1-2) يبين المدرج التكراري لأوزان الدجاج.

شكل (1-2)

المدرج التكراري لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة



3- رسم المدرج التكراري النسبي: لرسم المدرج التكراري النسبي يتم إجراء الآتي:


- حساب التكرارات النسبية.

الوزن	600-	620-	640-	660-	680-	700-720	Sum
عدد الدجاج	10	15	20	25	20	10	100
التكرار النسبي	0.10	0.15	0.20	0.25	0.20	0.10	1.00

- يتابع نفس الخطوات السابقة عند رسم المدرج التكراري، يتم رسم المدرج التكراري النسبي، بإحلال التكرارات النسبية محل التكرارات المطلقة على المحور الرأسي، كما هو مبين في الشكل التالي:

شكل (2-2)

المدرج التكراري النسبي لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة




ومن الشكل أعلاه يلاحظ الآتي:

- أن 25% من الدجاج يتراوح وزنه بين 660 ، 680 جرام وهي أكبر نسبة.
- أن الشكل ملتوي جهة اليسار، مما يدل على أن توزيع أوزان الدجاج سالب الالتواء.

### ملاحظات على شكل المدرج التكراري

- أن المساحة أسفل المدرج التكراري تساوي مجموع التكرارات (n).
- أما المساحة أسفل المدرج التكراري النسبي، فهي تعبر عن مجموع التكرارات النسبية، وهي تساوي الواحد الصحيح.
- يمكن تقدير القيم الشائعة، وهي القيم التي يناظرها أكبر ارتفاع، ففي الشكلين السابقين، نجد أن الوزن الشائع يقع في الفئة (660-680) ويطلق عليه المنوال.
- يمكن معرفة شكل توزيع البيانات، كما هو مبين بالأشكال الثلاثة التالية:

شكل (2-3)



## 2/3/2 المضلع التكراري

هو تمثيل بياني أيضا للجدول التكراري البسيط، حيث تمثل التكرارات على المحور الرأسي، ومراكز الفئات على المحور الأفقي، ثم التوصيل بين الإحداثيات بخطوط منكسرة، وبعد ذلك يتم توصيل طرفي المضلع بالمحور الأفقي.

ومركز الفئة هي القيمة التي تقع في منتصف الفئة، وتحسب بتطبيق المعادلة التالية:

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الأدنى للفئة} + \text{الحد الأعلى للفئة}}{2} \quad (3-2)$$

$$\text{Midpoint} = \frac{\text{Lower} + \text{Upper}}{2}$$

ونظرا لعدم معرفة القيم الفعلية لتكرار كل فئة، يعتبر مركز الفئة هو التقدير المناسب لقيمة كل مفردة من مفردات الفئة.

مثال (5-2)

استخدم بيانات الجدول التكراري في المثال (4-2) لرسم المضلع التكراري.

الحل

لرسم المضلع التكراري يتبع الآتي:

• حساب مراكز الفئات بتطبيق المعادلة رقم (3-2)

الوزن	عدد الدجاج (التكرار)	مركز الفئة (x)
600-	10	$(600+620)/2=610$
620-	15	$(620+640)/2=630$
640-	20	650
660-	25	670
680-	20	690
700-720	10	$(700+720)/710$
Sum	100	


• نقت الإحداثيات هي :

مركز الفئة (x)	590	610	630	650	670	690	710	730
التكرار (y)	0	10	15	20	25	20	10	0

• التمثيل البياني لنقط الإحداثيات وتوصيلها بخطوط مستقيمة، كما هو مبين بالشكل (4-2)

شكل (2-4)

المضلع التكراري لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة




### 3/3/2 المنحنى التكراري

باتباع نفس الخطوات السابقة في رسم المضلع يمكن رسم المنحنى التكراري، ولكن يتم تمهيد الخطوط المنكسرة في شكل منحنى بحيث يمر بأكثر عدد من النقاط، وفي المثال السابق يمكن رسم المنحنى التكراري، والشكل (2-5) يبين هذا الشكل.

شكل (2-5)


المنحنى التكراري لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة




كما يمكن رسم المنحنى التكراري النسبي بتمثيل التكرارات النسبية على المحور الرأسي بدلا من التكرارات المطلقة، ومن ثم يأخذ هذا المنحنى الشكل رقم (2-6) التالي:

شكل (2-6)

المنحنى التكراري النسبي لأوزان عينة من الدجاج حجمها 100 دجاجة



والمنحنى التكراري أعلاه موجب الالتواء، كما أن المساحة أسفل هذا المنحنى تعبر عن مجموع التكرارات النسبية، أي أنها تساوي الواحد الصحيح، وهناك أشكال مختلفة للمنحنى التكراري النسبي، تدل على أشكال توزيع البيانات، ومن أهمها ما يلي:



### 3/3 التوزيعات التكرارية المتجمعة

في كثير من الأحيان قد يحتاج الباحث إلى معرفة عدد المشاهدات التي تقل عن قيمة معينة أو تزيد عن قيمة معينة، ومن ثم يلجأ الباحث إلى تكوين جداول تجميعية صاعدة أو هابطة، وفيما يلي بيان كيفية تكوين كل نوع من هذين النوعين على حدة:

#### 1/3/3 التوزيع التكراري المتجمع الصاعد

لتكوين الجدول التكراري المتجمع الصاعد، يتم حساب مجموع التكرارات (عدد القيم) التي تقل عن كل حد من حدود الفئات.

مثال (2-6)

الجدول التكراري التالي يبين توزيع 40 بقرة في مزرعة حسب كمية الألبان التي تنتجها البقرة

في اليوم باللتر.

كمية الألبان	18-	22-	26-	30-	34-38	Sum
عدد الأبقار	4	9	15	8	4	40

والمطلوب:

- 1- كون جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد.
- 2- كون جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد النسبي.
- 3- ارسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد النسبي.
- 4- من المنحنى المتجمع أوجد الآتي:
  - نسبة الأبقار التي يقل إنتاجها عن 28 لتر.
  - كمية الإنتاج التي يقل عنها %25 من الأبقار.
  - كمية الإنتاج التي يقل عنها %50 من الإنتاج.


الحل

1- التوزيع التكراري المتجمع الصاعد.


التوزيع التكراري		توزيع تكراري متجمع صاعد		
كمية الإنتاج باللتر	عدد الأبقار	أقل من	تكرار متجمع صاعد	تكرار متجمع صاعد نسبي
18-	4	أقل من 18	0	0.00
22-	9	أقل من 22	4	0.10
26-	15	أقل من 26	13	0.325
30-	8	أقل من 30	28	0.70
34-38	4	أقل من 34	36	0.90
Sum	40	أقل من 38	40	1.00

- 2- التوزيع التكراري المتجمع الصاعد النسبي: يحسب التكرار المتجمع الصاعد النسبي بقسمة التكرار المتجمع الصاعد على مجموع التكرارات، كما هو مبين بالعمود الأخير في جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد.
- 3- رسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد: المنحنى التكراري المتجمع الصاعد النسبي هو التمثيل البياني للتوزيع التكراري المتجمع الصاعد النسبي، حيث تمثل حدود الفئات على المحور الأفقي، والتكرار المتجمع الصاعد النسبي على المحور الرأسي، ويتم تمهيد المنحنى ليمر بالإحداثيات، كما هو مبين في الشكل التالي:







- نسبة الأبقار التي يقل إنتاجها عن 28 لتر هي 0.47 تقريبا.



- كمية الإنتاج التي يقل عنها 25% من قيم الإنتاج هي: 25 لتر تقريبا.



- كمية الإنتاج التي يقل عنها 50% من قيم الإنتاج هي: 28.5 لتر، ويطلق عليها الوسيط:



### 2/3/3 التوزيع التكراري المتجمع الهابط (النازل)

لتكوين الجدول التكراري المتجمع النازل، يتم حساب مجموع التكرارات (عدد القيم) التي تساوي أو تزيد عن كل حد من حدود الفئات.

مثال (7-2)

استخدم بيانات الجدول التكراري في مثال (2-6)، وأوجد الآتي:

- 1- كون التوزيع التكراري المتجمع النازل.
- 2- ارسم المنحنى التكراري المتجمع النازل النسبي.

الحل:

1- تكوين التوزيع التكراري المتجمع النازل.


التوزيع التكراري

كمية الإنتاج باللتر	عدد الأبقار
18-	4
22-	9
26-	15
30-	8
34-38	4
Sum	40

توزيع تكراري متجمع نازل

تكرار متجمع نازل نسبي	تكرار متجمع نازل	تكرار أكثر من أو يساوي
1.00	40	أكثر من أو يساوي 18
0.90	36	أكثر من أو يساوي 22
0.675	27	أكثر من أو يساوي 26
0.30	12	أكثر من أو يساوي 30
0.10	4	أكثر من أو يساوي 34
0.00	0	أكثر من أو يساوي 38

رسم المنحنى التكراري المتجمع النازل.



ملاحظات:

- 1- يمكن رسم المنحنيان في شكل بياني واحد، ويلاحظ أنهما يتقاطعان عند نقطة تسمى الوسيط.
- 2- يكون استخدامنا للمنحنى المتجمع الصاعد أكثر وأوقع من الناحية التطبيقية.

### 4/3 العرض البياني للبيانات الوصفية

يمكن عرض البيانات الخاصة بمتغير وصفي في شكل دائرة بيانية أو أعمدة بيانية، يمكن من خلاله وصف ومقارنة مجموعات أو مستويات هذا المتغير.

#### 1/4/3 الدائرة البيانية

لعرض بيانات المتغير الوصفي في شكل دائرة، يتم توزيع الـ  $360^\circ$  درجة حسب التكرار النسبي لمجموعات المتغير، حيث تحدد مقدار الزاوية الخاصة بالمجموعة رقم  $r$  بتطبيق المعادلة التالية:

$$\text{التكرار النسبي للمجموعة} \times 360^\circ = \text{مقدار الزاوية}$$

مثال (2-8)

الجدول التكراري التالي يبين توزيع عينة حجمها 500 أسرة حسب المنطقة التي تنتمي إليها.

المنطقة	الرياض	الشرقية	القصيم	الغربية	sum
عدد الأسر	150	130	50	170	500

مثل البيانات أعلاه في شكل دائرة بيانية.

الحل:

1- تحديد مقدار الزاوية المخصصة لكل منطقة، بتطبيق المعادلة:

$$\text{التكرار النسبي للمنطقة} \times 360^\circ = \text{مقدار الزاوية المخصص للمنطقة}$$


المنطقة	عدد الأسر	التكرار النسبي	مقدار الزاوية
الرياض	150	0.30	$360 \times 0.30 = 108^\circ$
الشرقية	130	0.26	$360 \times 0.26 = 93.6^\circ$
القصيم	50	0.10	$360 \times 0.10 = 36^\circ$
الغربية	170	0.34	$360 \times 0.34 = 122.4^\circ$
Sum	500	1.00	$360^\circ$

## 2- رسم الدائرة

يتم رسم دائرة وتقسيمها إلى أربع أجزاء لكل منطقة جزء يتناسب مع مقدار الزاوية المخصصة له، كما هو مبين في الشكل التالي:

شكل رقم (2-7)

الدائرة البيانية لعينة حجمها 500 أسرة موزعة حسب المنطقة



ومن الشكل أعلاه يلاحظ أن نسبة الأسر التي تنتمي للمنطقة الغربية حوالي 34% وهي أكبر نسبة في العينة، بينما يكون نسبة الأسر في منطقة القصيم حوالي 10% وهي أقل نسبة في العينة.

## الفصل الثالث

### مقاييس التزعة المركزية

#### Central Tendency

### 1/3 مقدمة

في كثير من النواحي التطبيقية يكون الباحث في حاجة إلى حساب بعض المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في وصف الظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط القيم أو تترع إليها القيم ، ومن حيث التعرف على مدى تجانس القيم التي يأخذها المتغير ، وأيضا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم لا . والاعتماد على العرض البياني وحدة لا يكفي ، ولذا يتناول هذا الفصل ، والذي يليه عرض بعض المقاييس الإحصائية التي يمكن من خلالها التعرف على خصائص الظاهرة محل البحث ، وكذلك إمكانية مقارنة ظاهرتين أو أكثر ، ومن أهم هذه المقاييس ، مقاييس التزعة المركزية والتشتت .

### 2/3 مقاييس التزعة المركزية

تسمى مقاييس التزعة المركزية بمقاييس الموضع أو المتوسطات ، وهي القيم التي تتركز القيم حولها ، ومن هذه المقاييس ، الوسط الحسابي ، والنوال ، والوسيط ، والوسط الهندسي ، والوسط التوافقي ، والرابعيات ، والمئينات ، وفيما يلي عرض لأهم هذه المقاييس

#### 1/2/3 الوسط الحسابي Arithmetic Mean

من أهم مقاييس التزعة المركزية ، وأكثرها استخداما في النواحي التطبيقية ، ويمكن حسابه للبيانات المبوبة وغير المبوبة ، كما يلي :

#### أولا: الوسط الحسابي للبيانات غير المبوبة

يعرف الوسط الحسابي بشكل عام على أنه مجموع القيم مقسوما على عددها . فإذا كان لدينا  $n$  من القيم ، ويرمز لها بالرمز :  $x_1, x_2, \dots, x_n$  .

فإن الوسط الحسابي لهذه القيم ، ونرمز له بالرمز  $\bar{x}$  يحسب بالمعادلة التالية :

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}} \quad (1-3)$$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

حيث يدل الرمز  $\sum$  على المجموع .

مثال (3-1)

فيما يلي درجات 8 طلاب في مقرر 122 إحصاء تطبيقي .

34 32 42 37 35 40 36 40

والمطلوب إيجاد الوسط الحسابي لدرجة الطالب في الامتحان .

الحل

لإيجاد الوسط الحسابي للدرجات تطبيق المعادلة رقم (3-1) كما يلي:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$= \frac{34 + 32 + 42 + 37 + 35 + 40 + 36 + 40}{8} = \frac{296}{8} = 37$$

أي أن الوسط الحسابي لدرجة الطالب في اختبار مقرر 122 إحصاء يساوي 37 درجة

ثانياً: الوسط الحسابي للبيانات المبوبة

من المعلوم أن القيم الأصلية ، لا يمكن معرفتها من جدول التوزيع التكراري ، حيث أن هذه القيم موضوعة في شكل فئات ، ولذا يتم التعبير عن كل قيمة من القيم التي تقع داخل حدود الفئة بمركز هذه الفئة ، ومن ثم يؤخذ في الاعتبار أن مركز الفئة هو القيمة التقديرية لكل مفردة تقع في هذه الفئة.

فإذا كانت k هي عدد الفئات ، وكانت  $x_1, x_2, \dots, x_k$  هي مراكز هذه الفئات،

فإن التكرارات هي  $f_1, f_2, \dots, f_k$  هي التكرارات ، فإن الوسط الحسابي يحسب بالمعادلة التالية:

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i f_i}{\sum_{i=1}^k f_i} \quad (3-2)$$

مثال (3-2)

الجدول التالي يعرض توزيع 40 تلميذ حسب أوزانهم .

فئات الوزن	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42	42-44
عدد التلاميذ	4	7	13	10	5	1

والمطلوب إيجاد الوسط الحسابي.

الحل

لحساب الوسط الحسابي باستخدام المعادلة رقم (3-2) يتم إتباع الخطوات التالية :

- 1- إيجاد مجموع التكرارات  $\sum f$  .
- 2- حساب مراكز الفئات  $x$  .
- 3- ضرب مركز الفئة في التكرار المناظر له  $(xf)$  ، وحساب المجموع  $\sum xf$
- 4- حساب الوسط الحسابي بتطبيق المعادلة رقم (3-2) .

فئات الوزن (C)	التكرارات $f$	مراكز الفئات $x$	$x f$
32-34	4	$2=33 \div (32+34)$	$33=132 \times 4$
34-36	7	35	$35=245 \times 7$
36-38	13	37	$37=481 \times 13$
38-40	10	39	$39=390 \times 10$
40-42	5	41	$41=205 \times 5$
42-44	1	43	$43=43 \times 1$
المجموع	40		1496

إذا الوسط الحسابي لوزن التلميذ هو :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i f_i}{\sum_{i=1}^6 f_i} = \frac{1496}{40} = 37.4 \text{ k.g}$$

أي أن متوسط وزن التلميذ يساوي 37.4 k.g

### خصائص الوسط الحسابي

يتصف الوسط الحسابي بعدد من الخصائص ، ومن هذه الخصائص ما يلي :

- 1- الوسط الحسابي للمقدار الثابت يساوي الثابت نفسه ، أي أنه إذا كانت قيم  $x$  هي :

$x : a, a, \dots, a$  ، فإن الوسط الحسابي هو :

$$\bar{x} = \frac{a + a + \dots + a}{n} = \frac{na}{n} = a \quad (3-3)$$

ومثال على ذلك ، لو اخترنا مجموعة من 5 طلاب ، ووجدنا أن كل طالب وزنه 63 كيلوجرام ، فإن متوسط وزن الطالب في هذه المجموعة هو :

$$\bar{x} = \frac{63 + 63 + 63 + 63 + 63}{5} = \frac{315}{5} = 63 \text{ k.g}$$

- 2- مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يساوي صفرا ، ويعبر عن هذه الخاصية بالمعادلة .

$$\sum (x - \bar{x}) = 0 \quad (4-3)$$

ويمكن التحقق من هذه الخاصية باستخدام بيانات مثال (3-1) ، نجد أن درجات الطلاب هي

34, 32, 42, 37, 35, 40, 36, 40 : والوسط الحسابي للدرجة هو  $\bar{x} = 37$  ، إذا :

$x$	34	32	42	37	35	40	36	40	296
$(x - \bar{x})$	34-37	32-37	42-37	37-37	35-37	40-37	36-37	40-37	0
$(x - 37)$	-3	-5	5	0	-2	3	-1	3	

$$\sum(x-37) = 0 \quad \text{أي أن :}$$

3- إذا أضيف مقدار ثابت إلى كل قيمة من القيم ، فإن الوسط الحسابي للقيم المعدلة (بعد الإضافة) يساوى الوسط الحسابي للقيم الأصلية (قبل الإضافة) مضافا إليها هذا المقدار الثابت . فإذا كانت القيم هي :  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ، وتم إضافة مقدار ثابت (a) إلى كل قيمة من القيم ، ونرمز للقيم الجديدة بالرمز  $y$  ، أي أن  $y = x + a$  ، فإن : الوسط الحسابي لقيم  $y$  (القيم بعد الإضافة) هو :

$$\boxed{\bar{y} = \bar{x} + a} \quad (5-3)$$

حيث أن  $\bar{y}$  هو الوسط الحسابي للقيم الجديدة ، ويمكن التحقق من هذه الخاصية باستخدام بيانات مثال رقم (3-1) .  
إذا قرر المصحح إضافة 5 درجات لكل طالب ، فإن الوسط الحسابي للدرجات المعدلة يصبح قيمته  $\{(37+5)=42\}$  ، والجدول التالي يبين ذلك .

$x$	34	32	42	37	35	40	36	40	296
$y = (x + 5)$	34+5	32+5	42+5	37+5	35+5	40+5	36+5	40+5	336
	39	37	47	42	40	45	41	45	

نجد أن مجموع القيم الجديدة هو :  $\sum y = 336$  ، ومن ثم يكون الوسط الحسابي للقيم الجديدة هو :

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{336}{8} = 42 \rightarrow (\bar{x} + 5 = 37 + 5 = 42)$$

4- إذا ضرب مقدار ثابت (a) في كل قيمة من القيم ، فإن الوسط الحسابي للقيم المعدلة (القيم الناتجة بعد الضرب) يساوى الوسط الحسابي للقيم الأصلية (القيم بعد التعديل) مضروبا في هذا المقدار الثابت . أى أنه إذا كان :  $y = a x$  ، ويكون الوسط الحسابي للقيم الجديدة  $y$  هو :

$$\boxed{\bar{y} = a \bar{x}} \quad (6-3)$$



ويمكن للطالب أن يتحقق من هذه الخاصية باستخدام نفس بيانات المثال السابق . فإذا كان تصحيح الدرجة من 50 ، وقرر المصحح أن يجعل التصحيح من 100 درجة ، بمعنى أنه سوف يضرب كل درجة في قيمة ثابتة (a=2) ، ويصبح الوسط الحسابي الجديد هو :

$$\bar{y} = a \bar{x} = 2(37) = 74$$

5- مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي أقل ما يمكن ، أي أن:

$$\boxed{\sum (x - \bar{x})^2 < \sum (x - a)^2 \text{ if } a \neq \bar{x}} \quad (v-3)$$

وفي المثال السابق فإن :  $\sum (x - 37)^2 < \sum (x - a)^2$  لجميع قيم  $a \neq 37$

### ثالثا: الوسط الحسابي المرجح

في بعض الأحيان يكون لكل قيمة من قيم المتغير أهمية نسبية تسمى أوزن ، أو ترجيحات ، وعدم أخذ هذه الأوزان في الاعتبار عند حساب الوسط الحسابي ، تكون القيمة المعبرة عن الوسط الحسابي غير دقيقة ، فمثلا لو أخذنا خمسة طلاب ، وسجلنا درجات هؤلاء الطلاب في مقرر الإحصاء التطبيقي ، وعدد ساعات الاستذكار في الأسبوع .

مسلسل	1	2	3	4	5	sum
$X$ (الدرجة)	23	40	36	28	46	173
$W$ (عدد ساعات الاستذكار)	1	3	3	2	4	

نجد أن الوسط الحسابي غير المرجح للدرجة الحاصل عليها الطالب هي :

$$\bar{x} = \frac{\sum X}{n} = \frac{23+40+36+28+46}{5} = \frac{173}{5} = 34.6$$

وإذا أردنا أن نحسب الوسط الحسابي للدرجات  $X$  المرجحة بعدد ساعات الاستذكار  $W$  ، يتم تطبيق المعادلة التالية :

$$\begin{aligned} (\bar{w}) &= \frac{\sum xw}{\sum w} = \frac{23 \times 1 + 40 \times 3 + 36 \times 3 + 28 \times 2 + 46 \times 4}{1 + 3 + 3 + 2 + 4} \\ &= \frac{23 + 120 + 108 + 56 + 184}{13} = \frac{491}{13} = 37.769 \end{aligned}$$

وهذا الوسط المرجح أكثر دقة من الوسط الحسابي غير المرجح .

إذا الوسط الحسابي المرجح  $(\bar{w})$  يحسب بتطبيق المعادلة التالية :

$$\left( \overline{w} \right) = \frac{\sum xw}{\sum w} \quad (8-3)$$

### مزاياء وعيوب الوسط الحسابي

يتميز الوسط الحسابي بالمزايا التالية :

- أنه سهل الحساب .
- يأخذ في الاعتبار كل القيم .
- أنه أكثر المقاييس استخداما وفهما .
- ومن عيوبه .
- أنه يتأثر بالقيم الشاذة والمتطرفة .
- يصعب حسابه في حالة البيانات الوصفية .
- يصعب حسابه في حالة الجداول التكرارية المفتوحة .

### 2/2/3 الوسيط Median

هو أحد مقاييس النزعة المركزية، والذي يأخذ في الاعتبار رتب القيم ، ويعرف الوسيط بأنه القيمة التي يقل عنها نصف عدد القيم  $(n/2)$  ، ويزيد عنها النصف الآخر  $(n/2)$  ، أي أن 50% من القيم أقل منه، 50% من القيم أعلى منه. وفيما يلي كيفية حساب الوسيط في حالة البيانات غير مبوبة ، والبيانات المبوبة.

### أولاً: الوسيط للبيانات غير المبوبة

ليبان كيف يمكن حساب الوسيط للبيانات غير المبوبة ، نتبع الخطوات التالية:

- ترتب القيم تصاعديا .
- تحديد رتبة الوسيط، وهي : رتبة الوسيط =  $\left( \frac{n+1}{2} \right)$
- إذا كان عدد القيم  $(n)$  فردي فإن الوسيط هو:

$$\left( \frac{n+1}{2} \right) \text{ الوسيط = القيمة رقم} \quad (9-3)$$

- إذا كان عدد القيم  $(n)$  زوجي، فإن الوسيط يقع بين القيمة رقم  $(n/2)$  ، والقيمة رقم  $((n/2)+1)$  ، ومن ثم يحسب الوسيط بتطبيق المعادلة التالي:

$$\frac{\left(\frac{n}{2} + 1\right) \text{ القيمة رقم} + \left(\frac{n}{2}\right) \text{ القيمة رقم}}{2} = \text{الوسيط} \quad (10-3)$$

### مثال (3-3)

تم تقسيم قطعة أرض زراعية إلى 17 وحدة تجريبية متشابهة ، وتم زراعتها بمحصول القمح ، وتم استخدام نوعين من التسميد هما : النوع (a) وجرب على 7 وحدات تجريبية ، والنوع (b) وجرب على 10 وحدات تجريبية ، وبعد انتهاء الموسم الزراعي ، تم تسجيل إنتاجية الوحدة بالطن / هكتار ، وكانت على النحو التالي :

(a) النوع	1.2	2.75	3.25	2	3	2.3	1.5			
(b) النوع	4.5	1.8	3.5	3.75	2	2.5	1.5	4	2.5	3

والمطلوب حساب وسيط الإنتاج لكل نوع من السماد المستخدم، ثم قارن بينها.

### الحل

أولا : حساب وسيط الإنتاج للنوع الأول (a)

- ترتيب القيم تصاعديا :

	قيمة الوسيط						
الإنتاج	1.2	1.5	2	2.3	2.75	3	3.25
الرتبة	1	2	2	4	5	6	7
	رتبة الوسيط						

- عدد القيم فردى ( $n = 7$ )
- إذا رتبة الوسيط هي:  $((n+1)/2 = (7+1)/2 = 4)$  .
- ويكون الوسيط هو القيمة رقم 4 ، أي أن وسيط الإنتاج للنوع a هو:

$$Med_a = 2.3 \text{ طن / هكتار}$$

ثانيا : حساب وسيط الإنتاج للنوع الثاني (b) :

- ترتيب القيم تصاعديا .

	قيمة الوسيط = $\frac{2.5 + 3}{2}$										
الإنتاج	1.5	1.8	2	2.5	2.5	3	3.5	3.75	4	4.5	
الرتبة	1	2	3	4	5	5.5	6	7	8	9	10
	رتبة الوسيط										

- عدد القيم زوجي ( $n = 10$ ) إذا
- رتبة الوسيط هي :  $((n+1)/2 = (10+1)/2 = 5.5)$ .
- الوسيط = الوسط الحسابي للقيمتين الواقعتين في المنتصف (رقم 5 ، 6) .

$$Med_b = \frac{2.5 + 3}{2} = 2.75 \text{ طن / هكتار}$$

وبمقارنة النوعين من السماد ، نجد أن وسيط إنتاجية النوع (a) أقل من وسيط إنتاجية النوع

$$(b) ، \text{ أي أن : } Med_b > Med_a .$$


### ثانياً: الوسيط للبيانات المبوبة

لحساب الوسيط من بيانات مبوبة في جدول توزيع تكراري ، يتم إتباع الخطوات التالية .

- تكوين الجدول التكراري المتجمع الصاعد .

$$\left(\frac{n}{2}\right) = \left(\frac{\sum f}{2}\right) : \text{تحديد رتبة الوسيط}$$

- تحديد فئة الوسيط كما في الشكل التالي :



- ويحسب الوسيط ، بتطبيق المعادلة .

$$Med = A + \frac{\frac{n}{2} - f_1}{f_2 - f_1} \times L \quad (11-3)$$

حيث أن :

$L$  هي طول فئة الوسيط، وتحسب بالمعادلة التالية:

طول الفئة = الحد الأعلى - الحد الأدنى

$$L = Upper - Lower$$

### مثال (3-4)

فيما يلي توزيع 50 عجل متوسط الحجم ، حسب احتياجاته اليومية من الغذاء الجاف

بالكيلوجرام

فئات الاحتياجات اليومية	1.5 -	4.5 -	7.5 -	10.5 -	13.5 - 16.5
عدد العجول $f$	4	12	19	10	5

والمطلوب : حساب الوسيط : أ - حسابيا ب- بيانيا

الحل

أولا : حساب الوسيط حسابيا

$$\frac{n}{2} = \frac{\sum f}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

• رتبة الوسيط :

• الجدول التكراري المتجمع الصاعد :

أقل من	تكرار متجمع صاعد
1.5	0
4.5	4
$A_1$ 7.5	$f_1$ 16
Med (الوسيط)	25
10.5	$f_2$ 35
13.5	45
16.5	50

رتبة الوسيط

- تحديد فئة الوسيط : وهي الفئة التي تشمل قيمة الوسيط ، وهي قيمة أقل منها  $(n/2)$  من القيم ، ويمكن معرفتها بتحديد التكرارين المتجمعين الصاعدين الذين يقع بينهما رتبة الوسيط  $(n/2)$  ، وفي الجدول أعلاه نجد أن رتبة الوسيط (25) تقع بين التكرارين المتجمعين (35 ، 16) ، ويكون الحد الأدنى لفئة الوسيط هو المناظر للتكرار المتجمع الصاعد السابق 7.5 ، والحد الأعلى لفئة الوسيط هو المناظر للتكرار المتجمع الصاعد اللاحق 10.5 . أي أن فئة الوسيط هي : (7.5-10.5) .

- وتطبيق معادلة الوسيط رقم (3-11) على هذا المثال نجد أن :

$$A = 7.5 , f_1 = 16 , f_2 = 35 , L = 10.5 - 7.5 = 3$$


إذا الوسيط قيمته هي :

$$Med = A + \frac{\frac{n}{2} - f_1}{f_2 - f_1} \times L = 7.5 + \frac{25 - 16}{35 - 16} \times 3$$

$$= 7.5 + \frac{9}{19} \times 3 = 7.5 + \frac{27}{19} = 7.5 + 1.421 = 8.921 \text{ k.g}$$

ثانياً: حساب الوسيط بيانياً

- تمثيل جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد بيانياً .



- تحديد رتبة الوسيط (25) على المنحنى التكراري المتجمع الصاعد . ثم رسم خط مستقيم أفقي حتى يلقى المنحنى في النقطة (a) .
- إسقاط عمود رأسي من النقطة (a) على محور الأفقي .
- نقطة تقاطع الخط الرأسي مع محور الأفقي تعطى قيمة الوسيط .
- الوسيط كما هو مبين في الشكل  $Med = 8.6$  .

### مزايا وعيوب الوسيط

من مزايا الوسيط

- 1- لا يتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة .
- 2- كما أنه سهل في الحساب .
- 3- مجموع قيم الانحرافات المطلقة عن الوسيط أقل من مجموع الانحرافات المطلقة عن أي قيم

$$\sum |x - Med| \leq \sum |x - a| , a \neq Med \quad \text{أخرى . أي أن :}$$

ومن عيوب الوسيط

- 1- أنه لا يأخذ عند حسابه كل القيم في الاعتبار، فهو يعتمد على قيمة أو قيمتين فقط .  
 2- يصعب حسابه في حالة البيانات الوصفية المقاسة بمقياس اسمي nominal

### 3/2/3 المنوال Mode

يعرف المنوال بأنه القيمة الأكثر شيوعاً أو تكراراً ، ويكثر استخدامه في حالة البيانات الوصفية ، لمعرفة النمط ( المستوى ) الشائع، ويمكن حسابه للبيانات المبوبة وغير المبوبة كما يلي:

أولاً: حساب المنوال في حالة البيانات غير المبوبة

$$\text{المنوال (Mod) = القيمة (المستوى) الأكثر تكراراً} \quad (12-3)$$

ثانياً: حساب المنوال في حالة البيانات المبوبة (طريقة الفروق)

$$\text{Mod} = A + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \times L \quad (13-3)$$

حيث أن :

- A : الحد الأدنى لفئة المنوال (الفئة المناظرة لأكثر تكرار) .  
 $d_1$  : الفرق الأول = (تكرار فئة المنوال - تكرار سابق)  
 $d_2$  : الفرق الثاني = (تكرار فئة المنوال - تكرار لاحق)  
 L : طول فئة المنوال .

فئة المنوال = الفئة المناظرة لأكثر تكرار

$$\begin{aligned} & \text{تكرار سابق} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} d_1 = (\text{تكرار فئة المنوال} - \text{تكرار سابق}) \\ & \text{تكرار فئة المنوال} \\ & \text{تكرار لاحق} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} d_2 = (\text{تكرار فئة المنوال} - \text{تكرار لاحق}) \end{aligned}$$

مثال (3-5)

اختبرت عينات عشوائية من طلاب بعض أقسام كلية علوم الأغذية والزراعة ، وتم رصد درجات هؤلاء الطلاب في مقرر 122 إحصاء التطبيقي ، وكانت النتائج كالتالي:

قسم وقاية النباتات	80	77	75	77	77	77	65	70	58	67
قسم علوم الأغذية	88	68	60	75	93	65	77	85	95	90
قسم الاقتصاد	80	65	69	80	65	88	76	65	86	80
قسم الإنتاج الحيواني	85	73	69	85	73	69	69	73	72	85

والمطلوب حساب منوال الدرجات لكل قسم من الأقسام :

الحل

هذه البيانات غير مبوبة ، لذا فإن :

المنوال = القيمة الأكثر تكرارا

والجدول التالي يبين منوال الدرجة لكل قسم من الأقسام .

القسم	القيمة الأكثر تكرار	القيمة المنوالية
قسم وقاية النباتات	الدرجة 77 تكررت 4 مرات	المنوال = 77 درجة
قسم علوم الأغذية	جميع القيم ليس لها تكرار	لا يوجد منوال
قسم الاقتصاد	الدرجة 65 تكررت 3 مرات الدرجة 80 تكررت 3 مرات	يوجد منوالان هما : المنوال الأول = 65 المنوال الثاني = 80
قسم الإنتاج الحيواني	الدرجة 69 تكررت 3 مرات الدرجة 73 تكررت 3 مرات الدرجة 85 تكررت 3 مرات	يوجد ثلاث منوال هي : المنوال الأول = 69 المنوال الثاني = 73 المنوال الثالث = 85

مثال (3-6)

فيما يلي توزيع 30 أسرة حسب الإنفاق الاستهلاكي الشهري لها بالألف ريال .

فئات الإنفاق	2 -	5 -	8 -	11 -	14 - 17
عدد الأسر $f$	4	7	10	5	4

والمطلوب حساب منوال الإنفاق الشهري للأسرة، باستخدام طريقة الفروق .

الحل

لحساب المنوال لهذه البيانات يتم استخدام المعادلة رقم (3-12) ، ويتم إتباع الآتي :

• تحديد الفئة المنوالية

الفئة المنوالية هي الفئة المناظرة لأكبر تكرار : (8-11)



التكرارات	الفئات
4	2 -
7	5 -
10	8 -
5	11 -
4	14 - 17

فئة المنوال  $A = 8$

$d_1 = 10 - 7 = 3$

أكبر تكرار

$d_2 = 10 - 5 = 5$

• حساب الفروق  $d$  ، حيث أن :

$$d_1 = (10 - 7) = 3 \quad d_2 = (10 - 5) = 5$$

• تحديد الحد الأدنى للفئة المتوالية ( $A = 8$ ) ، وكذلك طول الفئة ( $L = 3$ )

• وبتطبيق المعادلة الخاصة بحساب المنوال في حالة البيانات المبوبة . نجد أن :

$$\begin{aligned} Mod &= A + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \times L \\ &= 8 + \frac{3}{3 + 5} \times 3 = 8 + 1.125 = 9.125 \end{aligned}$$


### 3/3 استخدام مقاييس الترتبة المركزية في تحديد شكل

#### توزيع البيانات

يمكن استخدام الوسط الحسابي والوسيط والمنوال في وصف المنحنى التكراري، والذي يعبر عن

شكل توزيع البيانات ، كما يلي :

شكل (3-1)



• يكون المنحنى متماثل إذا كان :

$$\text{الوسط} = \text{الوسيط} = \text{المنوال} .$$

• يكون المنحنى موجب الالتواء (ملتوي جهة اليمين) إذا كان :

$$\text{الوسط} < \text{الوسيط} < \text{المنوال}$$

• يكون المنحنى سالب الالتواء (ملتوي جهة اليسار) إذا كان :

$$\text{الوسط} > \text{الوسيط} > \text{المنوال}$$

مثال عام (3-7)

قام مدير مراقبة الإنتاج بسحب عينة من 10 عبوات من المياه المعبأة للشرب ، ذات الحجم 5 لتر ، والمنتجة بواسطة إحدى شركات تعبئة المياه لفحص كمية الأملاح الذائبة، وكانت كالتالي :  
115 123 119 123 124 119 123 121 123 121  
المطلوب : حساب الوسط الحسابي، والوسيط، والمنوال، ثم حدد شكل الالتواء لهذه البيانات .

الحل

حساب الوسط الحسابي :

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{1211}{10} = 121.1$$

• حساب الوسيط :

$$\text{رتبة الوسيط} : (n+1)/2 = (10+1)/2 = 5.5$$

ترتيب القيم تصاعديا

	قيمة الوسيط									
الطاقة	115	119	119	121	121	123	123	123	123	124
الرتبة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	رتبة الوسيط									

عدد القيم = 10 ، وهو عدد زوجي . الوسيط = الوسط الحسابي للقيمتين رقم ( 5 ، 6 )


$$Med = \frac{121+123}{2} = \frac{244}{2} = 122$$

• حساب المنوال :

المنوال يساوي القيمة الأكثر تكرارا: القيمة 123 تكررت أكثر من غيرها ، إذا

$$Mod = 123$$

وبمقارنة الوسط والوسيط و المنوال نجد أن :



نجد أن : الوسط > الوسيط > المنوال ، إذا توزيع بيانات كمية الأملاح سالبة الالتواء.

مثال (3-8)

الجدول التكراري التالي يعرض توزيع 100 عامل في مزرعة حسب الأجر اليومي بالريال .

الأجر	50 -	70 -	90 -	110 -	130 -	150 -	170 - 190
عدد العمال	8	15	28	20	15	8	6

والمطلوب :

- حساب الوسط والوسيط والمنوال .
- بيان شكل توزيع الأجر في هذه المزرعة .

الحل

- حساب الوسط والوسيط والمنوال .

أولا : الوسط الحسابي  $\bar{x}$

فئات الأجر	التكرارات ( f )	مراكز الفئات ( x )	f x
50 - 70	8	60	480
70 - 90	15	80	1200
90 - 110	28	100	2800
110 - 130	20	120	2400
130 - 150	15	140	2100
150 - 170	8	160	1280
170 - 190	6	180	1080
المجموع	100		11340

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{11340}{100} = 113.4 \text{ R.S}$$

ثانيا : الوسيط  $Med$

رتبة الوسيط :  $(n/2 = 100/2 = 50)$

تكوين التوزيع التكراري المتجمع الصاعد .

أقل من	تكرار متجمع صاعد
أقل من 50	0
أقل من 70	8
أقل من 90	$23 \leftarrow f_1$
أقل من 110	$51 \leftarrow f_1$
أقل من 130	71
أقل من 150	86
أقل من 170	94
أقل من 190	100

رتبة الوسيط ( 50 )

من الجدول أعلاه نجد أن :

$$\frac{n}{2} = 50, f_1 = 23, f_2 = 51, A = 90, L = 110 - 90 = 20$$

إذا الوسيط قيمته هي :

$$\begin{aligned} Med &= A + \frac{\frac{n}{2} - f_1}{f_2 - f_1} \times L = 90 + \frac{50 - 23}{51 - 23} \times 20 \\ &= 90 + \frac{27}{28} \times 20 = 90 + \frac{540}{28} = 90 + 19.286 = 109.3 \text{ R.S} \end{aligned}$$

ثالثا : المنوال  $Mod$

الفئة المنوالية ، هي الفئة المناظرة لأكبر تكرار

أكبر تكرار = 28 ، وهو يناظر الفئة التقريبية (90 - 110) .

$$\text{حساب الفروق : } d_2 = 28 - 20 = 8, d_1 = 28 - 15 = 13$$

$$\text{الحد الأدنى للفئة : } A = 90 \quad \text{طول الفئة : } L = 110 - 90 = 20$$

إذا المنوال يحسب بتطبيق المعادلة التالية :


$$Mod = A + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \times L = 90 + \frac{13}{13 + 8} \times 20 = 90 + \frac{260}{21} = 102.4 \text{ R.S}$$

• بيان شكل التوزيع .

من النتائج السابقة ، نجد أن :

$$\text{الوسيط الحسابي : } \bar{x} = 113.4 \quad \text{الوسيط : } Med = 109.3 \quad \text{المنوال : } Mod = 102.4$$

أي أن : الوسط < الوسيط < المنوال إذا توزيع بيانات الأجر موجب الالتواء. كما هو مبين في الشكل التالي:



## 4/3 الربعيات Quartiles

عند تقسيم القيم إلى أربع أجزاء متساوية، يوجد ثلاث إحصاءات ترتبي تسمى بالربعيات،


وهي:

• الربع الأول: وهو القيمة التي يقل عنها ربع عدد القيم، أي يقل عنها 25% من القيم، ويرمز له

- بالرمز  $Q_1$ .
  - الربيع الثاني: وهو القيمة التي يقل عنها نصف عدد القيم، أي يقل عنها 50% من القيم، ويرمز له بالرمز  $Q_2$ ، ومن ثم يعبر هذا الربيع عن الوسيط.
  - الربيع الثالث: وهو القيمة التي يقل عنها ثلاث أرباع عدد القيم، أي يقل عنها 75% من القيم، ويرمز له بالرمز  $Q_3$ .
- والشكل (3-3) يبين أماكن الرباعيات الثلاث.

شكل (3-3)

الرباعيات



ولحساب أي من الرباعيات الثلاث، يتم إتباع الآتي:

- بفرض أن عدد القيم عددها  $n$ ، وأنها مرتبة كالتالي:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{القيم مرتبة:} & X_{(1)} & < & X_{(2)} & < & X_{(3)} & < & X_{(n)} \\ \text{الرتبة :} & 1 & & 2 & & 3 & & n \end{array}$$

- تحديد رتبة الرباعي رقم  $i$ ،  $(Q_i)$  :  $R = (n+1) \times \left(\frac{i}{4}\right)$

- إذا كانت  $R$  عددا صحيحا فإن قيمة الربيع هو:  $Q_i = X_{(R)}$ .

- إذا كانت  $R$  عدد كسري، فإن الرباعي  $(Q_i)$  يقع في المدى:  $X_{(u)} < Q_i < X_{(l)}$ ، ومن ثم يحسب  $(Q_i)$  بالمعادلة التالية:

$$Q_i = X_{(l)} + (R - l)(X_{(u)} - X_{(l)}) \quad (3-14)$$

مثال (3-9)

فيما يلي كمية الإنتاج اليومي من الحليب باللتر للبقرة الواحدة لعينة حجمها 10 أبقار اختيرت من مزرعة معينة:

30 27 18 20 29 34 32 29 23 25

احسب الرباعيات الثلاث لكمية الإنتاج، وما هو تعليقك؟

الحل:

لحساب الرباعيات الثلاث، يتم إتباع الآتي:

- ترتيب القيم تصاعديا:

قيمة الربيع	22.25	28	30.5
-------------	-------	----	------

القيم	18	20	23	25	27	29	29	30	32	34
الرتبة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رتبة الربيع	2.75			5.5			8.25			

• حساب الربيع الأول ( $Q_1$ ):

$$R = (n + 1) \times \left(\frac{i}{4}\right) = (10 + 1) \times \left(\frac{1}{4}\right) = 2.75$$

رتبة الربيع الأول هي:  $R = 2.75$  يقع الربيع الأول بين القيمتين:  $(20 < Q_1 < 23)$  ، وتطبيق المعادلة (3-14) نجد أن:

$$l = 2, R = 2.75, x_{(l)} = 20, x_{(u)} = 23$$

إذا:

$$Q_1 = x_{(l)} + (R - l) \times (x_{(u)} - x_{(l)}) = 20 + 0.75(23 - 20) = 22.25$$

• حساب الربيع الثاني (الوسيط)  $Q_2$

$$R = (n + 1) \times \left(\frac{i}{4}\right) = (10 + 1) \times \left(\frac{2}{4}\right) = 5.5$$

رتبة الربيع الثاني هي:  $R = 5.5$  يقع الربيع الثاني بين القيمتين:  $(27 < Q_2 < 29)$  ، وتطبيق المعادلة (3-14) نجد أن:

$$l = 5, R = 5.5, x_{(l)} = 27, x_{(u)} = 29$$

إذا:

$$Q_2 = x_{(l)} + (R - l) \times (x_{(u)} - x_{(l)}) = 27 + 0.5(29 - 27) = 28$$

• حساب الربيع الثالث  $Q_3$

$$R = (n + 1) \times \left(\frac{i}{4}\right) = (10 + 1) \times \left(\frac{3}{4}\right) = 8.25$$


رتبة الربيع الثالث هي:  $R = 8.25$  يقع الربيع الثالث بين القيمتين:  $(30 < Q_3 < 32)$  ، وتطبيق المعادلة (3-14) نجد أن:

$$l = 8, R = 8.25, x_{(l)} = 30, x_{(u)} = 32$$

إذا:

$$Q_3 = x_{(l)} + (R - l) \times (x_{(u)} - x_{(l)}) = 30 + 0.25(32 - 30) = 30.5$$

من النتائج السابقة نجد أن:



- 25% من الأبقار يقل إنتاجه عن 22.25 لتر يوميا.
- 50% من الأبقار يقل إنتاجه عن 28 لتر يوميا.
- 75% من الأبقار يقل إنتاجه عن 30.5 لتر يوميا.

## تمارين

أولاً : استخدم البيانات التالية ، ثم أجب عما هو مطلوب باختيار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الأربعة : فيما يلي الطاقة التصديرية من المياه بالألف كيلومتر مكعب يوميا  $(x)$  ، لعدد 10 محطات تحلية .

$x$ : 342 216 105 291 107 216 210 165 90 216

- 1- هذه البيانات من النوع :  
(a) الكمي المنفصل (b) الكمي المتصل (c) الوصفي (d) الوصفي الترتيبي
- 2-  $\sum x$  قيمتها:  
(a) 1000 (b) 1958 (c) 195.8 (d) 216
- 3- قيمة الطاقة التصديرية التي أقل منها 50% من القيم تسمى :  
(a) الوسيط (b) الوسط (c) التباين (d) المدى
- 4- القيمة الأكثر تكرارا تسمى :  
(a) الوسيط (b) الوسط (c) المنوال (d) الانحراف
- 5- الوسط الحسابي للطاقة التصديرية قيمته :  
(a) 216 (b) 1958 (c) 195.8 (d) 213
- 6- المنوال قيمته  
(a) 216 (b) 1958 (c) 195.8 (d) 347
- 7- الوسيط قيمته  
(a) 213 (b) 1958 (c) 195.8 (d) 216
- 8- تعتبر بيانات الطاقة التصديرية أعلاه لها توزيع  
(a) متماثل (b) سالب الالتواء (c) موجب الالتواء (d) غير معروف .
- 9- إذا تم إدخال تعديل على هذه المحطات لزيادة الطاقة التصديرية لكل محطة 50 ألف كيلو متر مكعب ، يكون الوسط الحسابي للطاقة التصديرية بعد التطوير هو .  
(a) 216 (b) 1958 (c) 195.8 (d) 245.8
- 10- إذا كانت  $y = 0.5x$  فإن الوسط الحسابي للقيم التي يأخذها المتغير الجديد  $y$  هو :  
(a) 216 (b) 97.9 (c) 195.8 (d) 245.8

ثانيا : فيما يلي التوزيع التكرارى لعدد 50 مزرعة حسب المساحة المترعة بمحصول الطماطم بالألف دوغم .

المساحة بالألف دوغم	4.5 –	7.5 –	10.5 –	13.5 –	16.5–	19.5 – 22.5
عدد المزارع	3	8	12	15	10	2

استخدم بيانات الجدول أعلاه للإجابة على الأسئلة من (11- 20)

- 11- طول الفئة قيمته  
 1 (a) 2 (b) 3 (c) 5 (d)
- 12- الحد الأدنى للفئة الرابعة هو  
 14.5 (a) 16 (b) 15 (c) 13.5 (d)
- 13- مركز الفئة الثانية قيمته  
 9 (a) 8 (b) 10 (c) 3 (d)
- 14- مجموع التكرار النسبي للفئات يساوى :  
 0.30 (a) 0.20 (b) 1 (c) 1.50 (d)
- 15- إذا كانت  $x$  هي مركز الفئة ،  $f$  هو تكرار الفئة فإن  $\sum fx$  قيمته تساوى  
 225 (a) 225 (b) 50 (c) 681 (d)
- 16- الوسط الحسابى قيمته تساوى  
 8.33 (a) 13.5 (b) 13.62 (c) 681 (d)
- 17- الفئة التى يقع فيها قيمة الوسيط هي :  
 13.5 – (a) 16.5- 19.5 (b) 14 – (c) 17 10.5 – 13.5 (d)
- 18- رتبة الوسيط هي :  
 50 (a) 10 (b) 25 (c) 1 (d)
- 19- الوسيط قيمته تساوى .  
 13.9 (a) 13.5 (b) 15 (c) 12.5 (d)
- 20- المنوال قيمته تساوى :  
 14 (a) 15 (b) 13.5 (c) 14.625 (d)
- 21- من الإجابة 16 ، 19 ، 20 يكون شكل التوزيع .  
 (a) ملتوى جهة (b) متماثل (c) سالب (d) غير محدد



ثالثا : قم بتسجيل البيانات التالية :

الرقم الجامعي:

الإسم :

قم بتظليل الاختيار الصحيح من ( 1 - 21 ) ، ولا ينظر للإجابة التي بها مربعين مظللين :

رقم السؤال	(a)	(b)	(c)	(d)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

## الفصل الرابع مقاييس التشتت

### 1/4 مقدمة

عند مقارنة مجموعتين من البيانات ، يمكن استخدام شكل التوزيع التكراري، أو المنحنى التكراري ، وكذلك بعض مقاييس التزعة المركزية ، مثل الوسط الحسابي والوسيط ، والمنوال ، والإحصاءات الترتيبية ، ولكن استخدام هذه الطرق وحدها لا يكفي عند المقارنة ، فقد يكون مقياس التزعة المركزية للمجموعتين متساوي ، وربما يوجد اختلاف كبير بين المجموعتين من حيث مدى تقارب وتباعد البيانات من بعضها البعض ، أو مدى تباعد أو تقارب القيم عن مقياس التزعة المركزية .  
ومثال على ذلك ، إذا كان لدينا مجموعتين من الطلاب ، وكان درجات المجموعتين كالتالي :

المجموعة الأولى	63	70	78	81	85	67	88
المجموعة الثانية	73	78	77	78	75	74	77

لو قمنا بحساب الوسط الحسابي لكل مجموعة ، نجد أن الوسط الحسابي لكل منهما يساوي 76 درجة ، ومع ذلك درجات المجموعة الثانية أكثر تجانساً من درجات المجموعة الأولى . من أجل ذلك لجأ الإحصائيون إلى استخدام مقاييس أخرى لقياس مدى تجانس البيانات، أو مدى انتشار البيانات حول مقياس التزعة المركزية، ويمكن استخدامها في المقارنة بين مجموعتين أو أكثر من البيانات، ومن هذه المقاييس ، مقاييس التشتت ، والالتواء ، والتفرطح ، وسوف نركز في هذا الفصل على هذه المقاييس .

### 2/4 مقاييس التشتت Dispersion Measurements

من هذه المقاييس: المدى، والانحراف الربيعي، والانحراف المتوسط، والتباين، والانحراف المعياري .

#### Rang المدى 1/2/4

هو أبسط مقاييس التشتت ، ويحسب المدى في حالة البيانات غير المبوبة بتطبيق المعادلة التالية .

$$\text{المدى في حالة البيانات غير المبوبة} = \text{أكبر قراءة} - \text{أقل قراءة} \quad (1-4)$$

$$Rang = Max - Min$$

وأما المدى في حالة البيانات المبوبة له أكثر من صيغة، ومنها المعادلة التالية:

(٤-٣) المدى في حالة البيانات المبوبة = مركز الفئة الأخيرة - مركز الفئة الأولى

#### مثال (1-4)

تم زراعة 9 وحدات تجريبية بمحصول القمح ، وتم تسميدها بنوع معين من الأسمدة الفسفورية ، وفيما يلي بيانات كمية الإنتاج من القمح بالطن/ هكتار .

5.03 4.63 5.08 5.18 5.29 5.18 5.4 6.21 4.8

والمطلوب حساب المدى .

#### الحل

المدى = أكبر قراءة - أقل قراءة

أكبر قراءة = 6.21 أقل قراءة = 4.63

إذا المدى هو :

$$\text{Rang} = \text{Max} - \text{Min} = 6.21 - 4.63 = 1.58$$

المدى يساوي 1.58 طن / هكتار.

#### مثال (2-4)

الجدول التكراري التالي يبين توزيع 60 مزرعة حسب المساحة المترعة بالذرة بالألف دونم .

المساحة	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
عدد المزارع	3	9	15	18	12	3

والمطلوب حساب المدى للمساحة المترعة بالذرة .

#### الحل

المدى = مركز الفئة الأخيرة - مركز الفئة الأولى

مركز الفئة الأخيرة:  $(40+45)/2=85/2=42.5$  مركز الفئة الأولى:  $(15+20)/2=35/2=17.5$

$$\text{Rang} = 42.5 - 17.5 = 25 \quad \text{إذا}$$

أي أن المدى قيمته تساوي 25 دونم

#### مزايا وعيوب المدى

من مزايا المدى

- 1- أنه بسيط وسهل الحساب
- 2- يكثر استخدامه عند الإعلان عن حالات الطقس، و المناخ الجوي، مثل درجات الحرارة، والرطوبة، والضغط الجوي.
- 3- يستخدم في مراقبة الجودة .

2- ومن عيوبه

- أنه يعتمد على قيمتين فقط ، ولا يأخذ جميع القيم في الحسبان .
- يتأثر بالقيم الشاذة .

### Quartile Deviation (Q) الانحراف الربيعي 2/2/4

يعتمد المدى على قيمتين متطرفتين ، هما أصغر قراءة ، وأكبر قراءة ، فإذا كان هناك قيم شاذة، ترتب على استخدامه كمقياس للتشتت نتائج غير دقيقة، من أجل ذلك لجأ الإحصائيون، إلى استخدام مقياس للتشتت يعتمد على نصف عدد القيم الوسطى، ويهمل نصف عدد القيم المتطرفة، ولذا لا يتأثر هذا المقياس بوجود قيم شاذة، ويسمى هذا المقياس بالانحراف الربيعي (Q)، وبحسب الانحراف الربيعي بتطبيق المعادلة التالية .

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} \quad (3-4)$$

حيث أن  $Q_1$  هو الربع الأول ،  $Q_3$  هو الربع الثالث ، وقد بينا في الفصل الثالث كيف يمكن حساب هذان الرباعيان ، ومن المعادلة أعلاه ، يعرف الانحراف الربيعي بنصف المدى الربيعي ، أي أن :

الانحراف الربيعي = نصف المدى الربيعي

### مثال (3-4)

استخدم بيانات مثال (1-4) ، ثم احسب الانحراف الربيعي لكمية الإنتاج من القمح .

### الحل

- ترتيب القيم تصاعديا

الإنتاج	4.63	4.8	5.03	5.08	5.18	5.18	5.29	5.4	6.21
الرتبة	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- حساب الربع الأول  $Q_1$

$$\text{رتبة الربع الأول: } (n+1)\left(\frac{1}{4}\right) = (9+1)(0.25) = 2.5$$

$$x_{(l)} = x_{(2)} = 4.8 , x_{(u)} = x_{(3)} = 5.03 , R = 2.5 , l = 2 , R - l = 0.5$$

إذا

$$\begin{aligned} Q_1 &= x_{(l)} + (r-l)(x_{(u)} - x_{(l)}) \\ &= 4.8 + 0.5(5.03 - 4.8) = 4.915 \end{aligned}$$

- حساب الرباعي الثالث ( $Q_3$ )

$$(n+1)\left(\frac{3}{4}\right) = (9+1)(0.75) = 7.5 \quad \text{موقع الرباعي الثالث:}$$

$$x_{(l)} = x_{(7)} = 5.29, \quad x_{(u)} = x_{(8)} = 5.4, \quad R = 7.5, \quad l = 7, \quad R - l = 0.5$$

إذا

$$\begin{aligned} Q_3 &= x_{(l)} + (R-l)(x_{(u)} - x_{(l)}) \\ &= 5.29 + 0.5(5.4 - 5.29) = 5.345 \end{aligned}$$

• حساب الانحراف الربيعي

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{5.345 - 4.915}{2} = 0.215$$

• إذا الانحراف الربيعي قيمته تساوي 0.215 طن/ هكتار .

مثال (4-4)

• استخدم بيانات مثال رقم (4-2) في حساب نصف المدى الربيعي .

الحل:

• عند حساب الربيع الأول أو الثالث يتبع نفس الأسلوب المستخدم في حساب الوسيط.

• تكوين الجدول التكراري المتجمع الصاعد

• حساب الرباعي الأول ( $Q_1$ )

$$n(1/4) = 60(0.25) = 15 \quad \text{رتبة الربيعي الأول:}$$

$$f = 15, \quad f_1 = 12, \quad f_2 = 27, \quad A = 25, \quad L = 5$$

$$Q_1 = A + \frac{f - f_1}{f_2 - f_1} L$$

إذا

$$= 25 + \frac{15 - 12}{27 - 12} (5) = 25 + \frac{3}{15} (5) = 26$$

حدود المساحة	عدد المزارع	أقل من	تكرار متجمع
15-	3	15	0
20-	9	20	3
25-	15	A 25	$f_1$ 12
30-	18	30	$f_2$ 27 (15)
35-	12	A 35	45 (45)
40-45	3	40	57
sum	60	45	60

• حساب الرباعي الثالث ( $Q_3$ )

موقع الرباعي الثالث :  $n(3/4)=60(0.75)=45$   
 $f = 45$  ,  $f_1 = 45$  ,  $f_2 = 57$  ,  $A = 35$  ,  $L = 5$

إذا

$$Q_3 = A + \frac{f - f_1}{f_2 - f_1} L$$

$$= 35 + \frac{45 - 45}{57 - 45} (5) = 35 + \frac{(0)}{15} (5) = 35$$

• نصف المدى الربيعي .

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{35 - 26}{2} = 4.5$$

إذا الانحراف الربيعي للمساحة 4.5 ألف دوئم.

### مزايا وعيوب الانحراف الربيعي

من مزايا الانحراف الربيعي، يفضل استخدامه كمقياس للتشتت في حالة وجود قيم شاذة ، كما أنه بسيط وسهل في الحساب . ومن عيوبه ، أنه لا يأخذ كل القيم في الاعتبار .

### Mean Deviation (MD) 3/2/4 الانحراف المتوسط

هو أحد مقاييس التشتت، ويعبر عنه بمتوسط الانحرافات المطلقة للقيم عن وسطها الحسابي ، فإذا كانت  $x_1, x_2, \dots, x_n$  هي القراءات التي تم أخذها عن ظاهرة معينة ، وكان  $\bar{x} = \sum x/n$  ( عبارة عن الوسط الحسابي لهذه القراءات، فإن الانحراف المتوسط (MD) يحسب بتطبيق المعادلة التالية:

$$MD = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n} \quad (4-4)$$

وهذه الصيغة تستخدم في حالة البيانات غير المبوبة .

مثال (4-5)

إذا كانت الطاقة التصديرية لخمس محطات لتحلية المياه بالمليون متر مكعب كما يلي:

4 5 2 10 7

أوجد قيمة الانحراف المتوسط للطاقة التصديرية

الحل

حساب قيمة الانحراف المتوسط يتم استخدام المعادلة (4-4)

• الوسط الحسابي :

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{28}{5} = 5.6$$

ويتم تكوين الجدول التالي :

الطاقة التصديرية $x$	الانحرافات $(x - \bar{x}) = (x - 5.6)$	الانحرافات المطلقة $ x - 5.6 $
4	$4 - 5.6 = -1.6$	1.6
5	$5 - 5.6 = -0.6$	0.6
2	$2 - 5.6 = -3.6$	3.6
10	$10 - 5.6 = 4.4$	4.4
7	$7 - 5.6 = 1.4$	1.4
Sum	0	11.6

- إذا الانحراف المتوسط قيمته هي :

$$MD = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n} = \frac{11.6}{5} = 2.32 \text{ (مليون متر مكعب)}$$

وفي حالة البيانات الميوبة، بحسب الانحراف المتوسط باستخدام المعادلة التالية .

$$MD = \frac{\sum |x - \bar{x}| f}{n} \quad (5-4)$$

حيث أن  $f$  هو تكرار الفئة ،  $x$  هو مركز الفئة ،  $\bar{x}$  هو الوسط الحسابي.

#### مثال (4-6)

يبين الجدول التكراري التالي توزيع 40 أسرة حسب الإنفاق الشهري بالألف ريال.

الإنفاق	2 - 5	5 - 8	8 - 11	11 - 14	14 - 17
عدد الأسرة	1	8	13	10	8

أوجد الانحراف المتوسط .

الحل

لحساب الانحراف المتوسط ، يتم تطبيق المعادلة (4-5)، ويتبع الآتي

- تكوين جدول لحساب مكونات المعادلة:

حدود الإنفاق	عدد الأسر $f$	مركز الفئة $x$	$x f$	الوسط الحسابي $\bar{x}$	$ x - \bar{x} $	$ x - \bar{x}  f$
2-5	1	3.5	3.5	$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$ $= \frac{428}{40} = 10.7$	7.2	7.2
5-8	8	6.5	52		4.2	33.6
8-11	13	9.5	123.5		1.2	15.6
11-14	10	12.5	125		1.8	18
14-17	8	15.5	124		4.8	38.4
sum	40		428			

إذا الانحراف المتوسط هو :

$$MD = \frac{\sum |x - \bar{x}| f}{n} = \frac{112.8}{40} = 2.82$$

الانحراف المتوسط للإنتفاق الشهري هو 2.82 ألف ريال .

### مزاي و عيوب الانحراف المتوسط

من مزاي الانحراف المتوسط أنه يأخذ كل القيم في الاعتبار، ولكن يعاب عليه ما يلي:

- يتأثر بالقيم الشاذة .
- يصعب التعامل معه رياضيا .

### Variance التباين 4/2/4

هو أحد مقاييس التشتت ، وأكثرها استخداما في النواحي التطبيقية ، ويعبر عن متوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي .

أولاً: التباين في المجتمع ( $\sigma^2$ )

إذا توافر لدينا قراءات عن كل مفردات المجتمع ، ولتكن:  $x_1, x_2, \dots, x_N$  ، فإن التباين

في المجتمع ، ويرمز له بالرمز  $\sigma^2$  (سيجما) يحسب باستخدام المعادلة التالية :

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - u)^2}{N} \quad (6-4)$$

حيث أن  $\mu$  هو الوسط الحسابي في المجتمع ، أي أن:  $\mu = \sum x / N$  .

مثال (7-4)

مصنع لتعبئة المواد الغذائية ، يعمل به 15 عامل ، وكانت عدد سنوات الخبرة لهؤلاء العمال

كما يلي :

5 13 7 14 12 9 6 8 10 13 14 6 11 12 10

يفرض أن هذه البيانات تم جمعها عن كل مفردات المجتمع ، فأوجد التباين لعدد سنوات الخبرة .

الحل

لحساب تباين سنوات الخبرة في المجتمع ، يتم استخدام المعادلة (6-4) .

• الوسط الحسابي في المجتمع  $\mu$

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{1}{N} \sum x \\ &= \frac{1}{15} (5 + 13 + 7 + \dots + 12 + 10) = \frac{1}{15} (150) = 10 \end{aligned}$$



• حساب مربعات الانحرافات  $\sum(x-\mu)^2$

$$\sum(x-\mu)^2 = 130 \quad \text{بما أن:}$$

إذا تباين سنوات الخبرة للعمال في المصنع هو :

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x-u)^2}{N} = \frac{130}{15} = 8.67$$

سنوات الخبرة $x$	$(x-\mu)$	$(x-\mu)^2$
5	5-10 = -5	25
13	3	9
7	-3	9
14	4	16
12	2	4
9	-1	1
6	-4	16
8	-2	4
10	0	0
13	3	9
14	4	16
6	-4	16
11	1	1
12	2	4
10	0	0
150	0	130

ويمكن تبسيط المعادلة (4-6) في صورة أخرى كما يلي :

يمكن فك المجموع  $\sum(x-\mu)^2$  كالآتي :

$$\begin{aligned} \sum(x-\mu)^2 &= \sum(x^2 - 2x\mu + \mu^2) \\ &= \sum x^2 - 2\mu \sum x + \sum \mu^2 \\ &= \sum x^2 - 2N\mu^2 + N\mu^2 \\ &= \sum x^2 - N\mu^2 \end{aligned}$$

ومن ثم يكتب تباين المجتمع على الصورة التالية :

$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2 - N\mu^2}{N} = \frac{1}{N} \sum x^2 - \mu^2$$

إذا التباين في المجتمع يمكن صياغته كالتالي .

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum x^2 - \mu^2 \quad (v-4)$$

وبالتطبيق على المثال (7-4) ، نجد أن أننا نحتاج إلى المجموعين :  $\sum x$  ،  $\sum x^2$  ، ويتم عمل الآتي :

سنوات الخبرة $x$	$x^2$
5	25
13	169
7	49
14	196
12	144
9	81
6	36
8	64
10	100
13	169
14	196
6	36
11	121
12	144
10	100
150	1630

$$\sum x = 150 , \sum x^2 = 1630$$

$$\mu = \frac{1}{N} \sum x = \frac{1}{15} (150) = 10$$

إذا التباين هو

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum x^2 - \mu^2 \\ &= \frac{1}{15} 1630 - 10^2 = 108.67 - 100 = 8.67 \end{aligned}$$

وهي نفس النتيجة التي تم الحصول عليها باستخدام الصيغة (6-4) .

### ثانياً: التباين في العينة ( $S^2$ )

في كثير من الحالات يكون تباين المجتمع  $\sigma^2$  غير معلوم، وعندئذ يتم سحب عينة من هذا المجتمع ، ويحسب التباين من بيانات العينة كتقدير لتباين المجتمع ، فإذا كانت قراءات عينة عشوائية حجمها  $n$  هي ،  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ، فإن تباين العينة ويرمز له بالرمز  $S^2$  هو :

$$S^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (A-4)$$

حيث أن  $\bar{x}$  هو الوسط الحسابي لقراءات العينة ، أي أن :  $\bar{x} = \sum x/n$  ، وتباين العينة المبين بالمعادلة (8-4) هو التقدير غير المتحيز لتباين المجتمع .

## مثال (8-4)

في المثال (7-4) السابق ، إذا تم سحب عينة من عمال المصنع حجمها 5 عمال ، وسجل عدد سنوات الخبرة ، وكانت كالتالي .

8 13 10 5 9

احسب تباين سنوات الخبرة في العينة .

## الحل

لحساب التباين في العينة يتم تطبيق المعادلة (8-4)، ويتبع الآتي :

• الوسط الحسابي في العينة :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x = \frac{1}{5} (8+13+10+5+9) = \frac{1}{5} (45) = 9$$

• حساب مربعات الانحرافات  $\sum (x - \bar{x})^2$

سنوات الخبرة $x$	8	13	10	5	9	45
$(x - \bar{x})$	-1	4	1	-4	0	0
$(x - \bar{x})^2$	1	16	1	16	0	34

أي أن :  $\sum (x - \bar{x})^2 = 34$  ،

• إذا تباين سنوات الخبرة في العينة قيمته هي :

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{34}{(5 - 1)} = \frac{34}{4} = 8.5$$

• في هذه الحالة يمكن القول بأن تباين العينة 8.5، وهو في نفس الوقت تقدير غير متحيز لتباين المجتمع .

## تبسيط العمليات الحسابية

يمكن تبسيط الصيغة الرياضية لتباين العينة الموضحة بالمعادلة (8-4) إلى صيغة سهلة يمكن التعامل معها، وخاصة إذا كانت البيانات تحتوي على قيم كسرية، ولاستنتاج هذه الصيغة يتم إتباع الآتي.

يمكن فك المجموع  $\sum (x - \bar{x})^2$  كالتالي:

$$\begin{aligned}
\Sigma(x - \bar{x})^2 &= \Sigma(x^2 - 2x\bar{x} + \bar{x}^2) \\
&= \Sigma x^2 - 2\bar{x}\Sigma x + \Sigma \bar{x}^2 \\
&= \Sigma x^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 \\
&= \Sigma x^2 - n\bar{x}^2
\end{aligned}$$

ويكتب تباين العينة على الصورة التالية :

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left( \Sigma x^2 - n\bar{x}^2 \right)$$

إذا التباين في العينة يمكن صياغته كالتالي .

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left( \Sigma x^2 - n\bar{x}^2 \right) \quad (9-4)$$

كما يمكن إثبات أن المعادلة (9-4) تأخذ الشكل التالي:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left( \Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n} \right) \quad (10-4)$$

وبالتطبيق على بيانات المثال السابق ، نجد أن :

سنوات الخبرة $x$	8	13	10	5	9	45
$x^2$	64	169	100	25	81	439

• تباين العينة باستخدام المعادلة (9-4) هو :

$$\begin{aligned}
s^2 &= \frac{1}{n-1} \left( \Sigma x^2 - n\bar{x}^2 \right) \\
&= \frac{1}{5-1} \left( 439 - 5(9)^2 \right) = \frac{1}{4} (34) = 8.5
\end{aligned}$$

• وباستخدام المعادلة (10-4) نجد أن:

$$\begin{aligned}
s^2 &= \frac{1}{n-1} \left( \Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n} \right) \\
&= \frac{1}{5-1} \left( 439 - \frac{(45)^2}{5} \right) = \frac{1}{4} (439 - 405) = \frac{1}{4} (34) = 8.5
\end{aligned}$$

## Standard Deviation الانحراف المعياري

عند استخدام التباين كمقياس من مقاييس التشتت، نجد أنه يعتمد على مجموع مربعات الانحرافات، ومن ثم لا يتمشى هذا المقياس مع وحدات قياس المتغير محل الدراسة، ففي المثال السابق، نجد أن تباين سنوات الخبرة في العينة 8.5، فليس من المنطق عند تفسير هذه النتيجة أن نقول، "تباين سنوات الخبرة هو 8.5 سنة تربيع"، لأن وحدات قياس المتغير هو عدد السنوات، من أجل ذلك لجأ الإحصائيين إلى مقياس منطقي يأخذ في الاعتبار الجذر التربيعي للتباين، لكي يناسب وحدات قياس المتغير، وهذا المقياس هو الانحراف المعياري.

إذا الانحراف المعياري، هو الجذر التربيعي الموجب للتباين، أي أن:

$$\boxed{\text{التباين}} = \text{الانحراف المعياري} \quad (11-4)$$

ومثال على ذلك:

- في مثال (7-4) نجد أن الانحراف المعياري لسنوات الخبرة لعمال المصنع (المجتمع)، ويرمز له بالرمز  $(\sigma)$  هو:

$$\begin{aligned} \sigma &= \sqrt{\frac{1}{N} \sum x^2 - \mu^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{15} 1630 - 10^2} = \sqrt{8.67} = 2.94 \end{aligned}$$

في هذه الحالة، يكون الانحراف المعياري لسنوات الخبرة في المجتمع هو 2.94 سنة.

- في مثال (8-4) نجد أن الانحراف المعياري لسنوات الخبرة لعمال العينة، ويرمز له بالرمز  $S$ ، هو:

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \left( \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right)} \\ &= \sqrt{\frac{1}{5-1} \left( 439 - \frac{(45)^2}{5} \right)} = \sqrt{\frac{1}{4} (439 - 405)} = \sqrt{\frac{1}{4} (34)} = 2.92 \end{aligned}$$

أي أن الانحراف المعياري لسنوات الخبرة في العينة هو 2.92 سنة.

## الانحراف المعياري في حالة البيانات المبوبة

إذا كانت بيانات الظاهرة، مبوبة في جدول توزيع تكراري، فإن الانحراف المعياري يحسب

بتطبيق المعادلة التالية.

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2 f}{n - 1}}$$

or

$$s = \sqrt{\frac{\sum x^2 f - \frac{(\sum xf)^2}{n}}{n - 1}} \quad (12-4)$$

حيث أن  $f$  هو تكرار الفئة ،  $X$  هو مركز الفئة ،  $\bar{X}$  هو الوسط الحسابي  $(\sum xf/n)$  ،  $n$  هي مجموع التكرارات  $(n = \sum f)$  ، والمقدار الذي تحت الجذر يعبر عن التباين  $(s^2)$  .

مثال (9-4)

في بيانات مثال (6-4) ، احسب الانحراف المعياري للإنفاق الشهري للأسرة ، ثم قارن بين الانحراف المتوسط ، والانحراف المعياري للإنفاق الشهري للأسرة .

الحل

لحساب الانحراف المعياري للإنفاق الشهري ، تستخدم المعادلة رقم (12-4) ، وسوف نطبق

الصيغة الثانية ، ولذا نكون جدول لحساب المجموعين :  $\sum xf$  ،  $\sum x^2 f$  .

الإنفاق	عدد الأسر $f$	مركز الفئة $X$	$xf$	$x^2 f$
2-5	1	3.5	3.5	12.25
5-8	8	6.5	52	338
8-11	13	9.5	123.5	1173.25
11-14	10	12.5	125	1562.5
14-17	8	15.5	124	1922
sum	40		428	5008

$$n = \sum f = 40$$

$$\sum xf = 428$$

$$\sum x^2 f = 5008$$

وبتطبيق المعادلة ، نجد أن الانحراف المعياري قيمته هي :

$$\begin{aligned}
s &= \sqrt{\frac{\sum x^2 f - \frac{(\sum xf)^2}{n}}{n-1}} \\
&= \sqrt{\frac{5008 - \frac{(428)^2}{40}}{40-1}} = \sqrt{\frac{5008 - 4579.6}{39}} \\
&= \sqrt{10.984615} = 3.314
\end{aligned}$$

أي أن الانحراف المعياري للإنفاق الشهري 3.314 ألف ريال ، ووفقا لهذا المقياس ، فإن تشتت بيانات الإنفاق أكبر من تشتت بيانات الإنفاق وفقا لمقياس الانحراف المتوسط (2.88) .

### خصائص الانحراف المعياري

من خصائص الانحراف المعياري ، ما يلي :

- أولا : الانحراف المعياري للمقدار الثابت يساوي صفرا ، أي أنه إذا كان لدينا القراءات التالية:  
 $x: a, a, a, \dots, a$  حيث أن  $a$  مقدار ثابت فإن :  $S_x = 0$  ، حيث أن  $S_x$  تعبر عن الانحراف المعياري لقيم  $x$  .

- ثانيا : إذا أضيف مقدار ثابت إلى كل قيمة من قيم المفردات ، فإن الانحراف المعياري للقيم الجديدة (القيم بعد الإضافة) تساوي الانحراف المعياري للقيم الأصلية (القيم بعد الإضافة) ، فإذا كانت القيم الأصلية هي  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ، وتم إضافة مقدار ثابت  $a$  إلى كل قيمة من قيم  $x$  ، فإن الانحراف المعياري للقيم الجديدة :  $x_1 + a, x_2 + a, \dots, x_n + a$  :  $(y = x + a)$  هي :  
 $S_y = S_x$

### مثال (4-10)

إذا كان من المعلوم أن تطبيق برنامج غذائي معين للتسمين لفترة زمنية محددة سوف يزيد من وزن الدجاجة 0.5 كيلوجرام، سحبت عينة عشوائية من مزرعة دجاج حجمها 5 دجاجات، وكانت أوزانها كالتالي: 1, 1.75, 2, 1.25, 2.5 .

1- احسب الانحراف المعياري لوزن الدجاجة.

2- إذا طبق البرنامج الغذائي المشار إليه، ما هو الانحراف المعياري لوزن الدجاجة في هذه العينة؟

### الحل

1- حساب الانحراف المعياري للوزن قبل تطبيق البرنامج .

$x$	$x^2$
1	1

$$n = 5$$

1.75	3.0625
2	4
1.25	1.5625
2.5	6.25
8.5	15.875

إذا الانحراف المعياري للوزن قبل البرنامج في العينة هو:

$$\begin{aligned}
 s_x &= \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n-1}} \\
 &= \sqrt{\frac{15.875 - \frac{(8.5)^2}{5}}{5}} = \sqrt{\frac{15.875 - 14.45}{5}} = 0.534 \\
 &= \sqrt{10.984615} = 3.314
 \end{aligned}$$

2- حساب الانحراف المعياري لوزن الدجاجة بعد تطبيق البرنامج .

كل دجاجة بعد تطبيق البرنامج، من المتوقع أن تزيد 0.5 كيلوجرام ، وهذا معناه أن الوزن بعد البرنامج هو :  $y = x + 0.5$  ، ويكون الانحراف المعياري للوزن الجديد مساويا أيضا للانحراف المعياري للقيم الأصلية ، أي أن :

$$s_y = s_x = 0.534$$

الانحراف المعياري للوزن بعد تطبيق البرنامج يساوي 0.534 كيلوجرام .

- ثالثا : إذا ضرب كل قيمة من قيم المفردات في مقدار ثابت ، فإن الانحراف المعياري للقيم الجديدة ، يساوي الانحراف المعياري للقيم الأصلية مضروبا في الثابت ، أي أن إذا كان قيم  $x$  هي القيم الأصلية ، وكانت القيم الجديدة هي :  $y = ax$  ، حيث أن  $a$  مقدار ثابت ، فإن :  $s_y = as_x$  .

ومثال على ذلك ، إذا كان الانحراف المعياري لدرجات عينة من الطلاب هي 4 درجات ، وإذا كان التصحيح من 50 درجة ، ويراد تعديل الدرجة ليكون التصحيح من 100 درجة ، ومعنى يتم ضرب كل درجة من الدرجات الأصلية في 2 ، ومن ثم يحسب الانحراف المعياري للدرجات المعدلة كالتالي

$$y = 2x$$

$$s_y = 2s_x = 2(4) = 8$$

إذا الانحراف المعياري للدرجات المعدلة 8 درجات .

- رابعا: إذا كان لدينا التوليفة الخطية :  $y = ax + b$  ، فإن الانحراف المعياري للمتغير  $y$  هو



أيضا :  $S_y = aS_x$  ، وفي المثال السابق ، لو أضف المصحح لكل طالب 5 درجات بعد تعديل الدرجة من 100 ، أى أن الدرجة الجديدة هي :  $y = 2x + 5$  ، فإن الانحراف المعياري هو :

$$y = 2x + 5$$

$$S_y = 2S_x = 2(4) = 8$$

### مزايا وعيوب الانحراف المعياري

من مزايا الانحراف المعياري


- 1- أنه أكثر مقاييس التشتت استخداما .
  - 2- يسهل التعامل معه رياضيا .
  - 3- يأخذ كل القيم في الاعتبار .
- ومن عيوبه ، أنه يتأثر بالقيم الشاذة .

## الفصل الخامس

### معامل الاختلاف النسبي وتطبيقاته

#### 1/5 مقدمة

عند تمثيل بيانات الظاهرة في شكل منحنى تكراري ، فإن هذا المنحنى يأخذ أشكالا مختلفة ، فقد يكون هذا المنحنى متماثل بمعنى أن له قمة في المنتصف ، ولو أسقطنا عمودا من قمته على المحور الأفقي لشطره نصفين متماثلين ، مثل منحنى التوزيع الطبيعي ، كما هو مبين بالشكل التالي .



منحنى التوزيع الطبيعي (منحنى متماثل)

وعندما يكون الشكل متماثل ، فإن الوسط والوسيط والمنوال كلهم يقعون على نقطة واحدة ، ولكن في كثير من الحالات يكون هناك قيم كبيرة في البيانات تجذب إليها الوسط الحسابي ، وهذا معناه أن المنحنى التكراري سوف يكون له ذيل جهة اليمين ، مشيرا بوجود التواء جهة اليمين ، وكذلك العكس لو أن البيانات بها قيم صغيرة ، فإنها تجذب الوسط إليها، وبدل المنحنى التكراري على وجود التواء جهة اليسار، كما يمكن من خلال الشكل البياني معرفة ما إذا كان توزيع البيانات منبسطة، أو مدبب، وهذا من الناحية البيانية، إلا أن هناك مقاييس كثيرة لوصف البيانات تعتمد في حسابها على مقاييس التزعة المركزية والتشتت معا، ومنها مقاييس الالتواء، والتفرطح، وبعض المقاييس الأخرى سوف يتم عرضها فيما بعد.

#### 2/5 مقاييس الالتواء Skewness

هناك طرق كثيرة لقياس الالتواء ومنها ما يلي:

#### 1/2/5 طريقة "بيرسون Person" في قياس الالتواء

تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار العلاقة بين الوسط والوسيط والمنوال، في حالة ما إذا كان التوزيع قريب من التماثل وليس شديد الالتواء ، وهذه العلاقة هي: (1-5)

$$\text{المنوال} = \text{الوسط الحسابي} - 3(\text{الوسط الحسابي} - \text{الوسيط}) \quad (1-5)$$

ومن ثم فإن طريقة "بيرسون" في قياس الالتواء ، تتحدد بالمعادلة التالية.


$$\alpha = \frac{3(\text{Mean} - \text{Median})}{\text{Standard Deviation}} = \frac{3(\bar{x} - \text{Med})}{S} \quad (2-5)$$

حيث أن  $\alpha$  (ألفا) هو معامل الالتواء "ليبرسون"،  $\bar{x}$  الوسط الحسابي،  $Med$  هو الوسيط،  $S$  هو الانحراف المعياري، ويمكن من خلال الإشارة التي يأخذها هذا المعامل الحكم على شكل الالتواء، كما يلي :

- إذا كان (الوسط الحسابي = الوسيط) كان قيمة المعامل ( $\alpha = 0$ )، ويدل ذلك على أن منحني التوزيع التكراري متماثل.
- إذا كان (الوسط الحسابي < الوسيط) كان قيمة المعامل ( $\alpha > 0$ )، ويدل ذلك على أن منحني التوزيع التكراري ملتوي جهة اليمين .
- إذا كان (الوسط الحسابي > الوسيط) كان قيمة المعامل ( $\alpha < 0$ )، ويدل ذلك على أن منحني التوزيع التكراري ملتوي جهة اليسار.

شكل (1-5)

أشكال التواء البيانات



## 2/2/5 طريقة "المئين" في قياس الالتواء

المئين ينتج من ترتيب البيانات تصاعدياً، ثم تقسيمها البيانات إلى 100 جزء، يفصل بينها قيم تسمى المئين، وعلى سبيل المثال يعرف المئين 15 ويرمز له بالرمز ( $v_{15}$ ) على أنه القيمة التي يقل عنها 15% من القيم، وحساب قيمة المئين  $p$ ، ونرمز له بالرمز ( $v_p$ )، يتبع نفس الفكرة المستخدمة في حساب الربيع كما يلي:

$$x_{(1)} < x_{(2)} < \dots < x_{(n)} \quad \bullet \quad \text{ترتب القيم تصاعدياً:}$$

$$R = (n+1) \left( \frac{p}{100} \right) \quad \bullet \quad \text{رتبة المئين:}$$

$$\bullet \quad \text{إذا كانت الرتبة } R \text{ عدد صحيح فإن } (v_{15} = x_{(R)})$$

$$\bullet \quad \text{أما إذا كانت الرتبة } R \text{ عدد كسري فإن قيمة المئين } (v_p) \text{ تحسب بالمعادلة التالية:}$$

$$v_p = x_{(l)} + (R - l)(x_{(u)} - x_{(l)}) \quad (3-5)$$

وتعتمد فكرة المئين في قياس الالتواء على مدى قرب المئين  $v_p$ ، والمئين  $v_{100-p}$ ، من المئين  $v_{50}$ ، وكمثال على ذلك، عند قياس الالتواء باستخدام المئين 20، والمئين 80، يلاحظ على الرسم التالي

حالات الالتواء :

شكل (5-2)



ومن الشكل أعلاه يلاحظ الآتي :

- إذا كان بعد المتين ( $v_{80}$ ) عن المتين ( $v_{50}$ ) يساوي بعد المتين ( $v_{20}$ ) عن المتين ( $v_{50}$ ) كان التوزيع متماثلاً .
  - إذا كان بعد المتين ( $v_{80}$ ) عن المتين ( $v_{50}$ ) أكبر من بعد المتين ( $v_{20}$ ) عن المتين ( $v_{50}$ ) كان التوزيع موجب الالتواء .
  - إذا كان بعد المتين ( $v_{80}$ ) عن المتين ( $v_{50}$ ) أقل من بعد المتين ( $v_{20}$ ) عن المتين ( $v_{50}$ ) كان التوزيع سالب الالتواء .
- وبشكل عام يمكن الحكم على شكل التوزيع باستخدام معامل الالتواء المثيفي، ويأخذ المعادلة التالية.

$$\alpha_{p,100-p} = \frac{(v_{100-p} - v_{50}) - (v_{50} - v_p)}{v_{100-p} - v_p} \quad (4-5)$$

حيث أن :  $v_p < v_{50} < v_{100-p}$  ويفضل استخدام هذا المعامل في حالة البيانات التي تحتوي على قيم شاذة ، وأيضا البيانات التي لا نعرف لها توزيع محدد، وعندما نستخدم المتين 25 ( $v_{25} = Q_1$ ) ، المتين 75 ( $v_{75} = Q_3$ ) نحصل على معامل الالتواء الربيعي ، وهو :

$$v_q = \frac{(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1)}{(Q_3 - Q_1)} \quad (5-5)$$

## مثال (5-1)

كانت درجات 8 طلاب في الاختبار النهائي في مقرر 122 إحص ، كالتالي.

66 85 52 78 80 91 74 58

1- حساب معامل الالتواء بطريقة "بيرسون" .

2- حساب معامل الالتواء الربيعي .

الحل

1- حساب معامل الالتواء بطريقة "بيرسون" .

في هذه الحالة يتم تطبيق المعادلة رقم (5-2) كما يلي:

- حساب الوسط الحسابي ، والانحراف المعياري :

الدرجة $x$	$x^2$
66	4356
85	7225
52	2704
78	6084
80	6400
91	8281
74	5476
58	3364
584	43890

$$\sum x = 584 , \sum x^2 = 43890$$

ويكون :

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{584}{8} = 73$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2/n}{n-1}} = \sqrt{\frac{43890 - (584)^2/8}{8-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{1258}{7}} = \sqrt{179.71428} = 13.406$$

- حساب الوسيط :

$$(n+1)/2 = (8+1)/2 = 4.5$$

52	58	66	74	78	80	85	91
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.25		4.5		6.75		

$$Med = 74 + 0.5(78 - 74) = 76$$

- معامل الالتواء "بيرسون"

$$s.c = \frac{3(\bar{x} - Med)}{S} = \frac{3(73 - 76)}{13.406} = -0.67$$

إذا منحني توزيع درجات الطلاب ملتوي جهة اليسار .

- 2 معامل الالتواء الربيعي .

لحساب معامل الالتواء الربيعي ، يتم تطبيق المعادلة رقم (5-5).

- حساب الربيع الأدنى .

$$(n+1)/4 = (8+1)(1/4) = 2.25$$

إذا

$$Q_1 = 58 + (2.25 - 2)(66 - 58) = 60$$

• حساب الرباعي الأعلى.

$$\text{موقع الرباعي} : (n+1)/(3/4) = (8+1) (3/4) = 6.75$$

إذا

$$Q_3 = 80 + (6.75 - 6)(85 - 80) = 83.75$$

• الوسيط (الربيع الثاني)

$$\text{Med}(Q_2) = 76$$


إذا معامل الالتواء الربيعي هو :

$$\begin{aligned} \alpha_q &= \frac{(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1)}{(Q_3 - Q_1)} = \frac{(83.75 - 76) - (76 - 60)}{(83.75 - 60)} \\ &= \frac{-8.25}{23.75} = -0.35 \end{aligned}$$

إذا توزيع درجات الطلاب ملتوي جهة اليسار.

### 3/5 التفرطح Kurtosis

عند تمثيل التوزيع التكراري في شكل منحنى تكراري ، قد يكون هذا المنحنى منبسط ، أو مدبب ، فعندما يتركز عدد أكبر من القيم بالقرب من منتصف المنحنى ، ويقبل في طرفيه ، يكون المنحنى مدببا ، وعندما يتركز عدد أكبر على طرفي المنحنى ، ويقبل بالقرب من المنتصف يكون المنحنى مفترحا ، أو منبسطا ، ويظهر ذلك من الشكل التالي :



ويمكن قياس التفرطح باستخدام عدد من الطرق ، ومنها طريقة العزوم ، حيث يحسب معامل

التفرطح (K) بتطبيق المعادلة التالية :

$$k = \frac{\frac{1}{n} \sum (x - \bar{x})^4}{s^4} \quad (6-5)$$

حيث أن المقدار  $\sum (x - \bar{x})^4 / n$  هو العزم الرابع حول الوسط ،  $s$  هو الانحراف المعياري . ومعامل التفرطح في التوزيع الطبيعي يساوي 3 ، ومن ثم يمكن وصف منحى التوزيع من حيث التفرطح ، والتدبب كما يلي :

- إذا كان  $k=3$  كان منحى التوزيع معتدلا .
- إذا كان  $k>3$  كان منحى التوزيع مدببا .
- إذا كان  $k<3$  كان منحى التوزيع منبسطا (مفرطحا) .

وبالتطبيق على بيانات المثال رقم (5-1) نجد أن:  $\bar{x} = 73$

$x$	66	85	52	78	80	91	74	58	584
$(x - \bar{x})$	-7	12	-21	5	7	18	1	-15	0
$(x - \bar{x})^2$	49	144	441	25	49	324	1	225	1258
$(x - \bar{x})^4$	2401	20736	194481	625	2401	104976	1	50625	376246

ومن البيانات أعلاه نجد أن:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{1258}{7}} = 13.406$$

$$\frac{1}{n} \sum (x - \bar{x})^2 = \frac{1}{8} (376246) = 47030.75$$

إذا معامل التفرطح هو:

$$K = \frac{47030.75}{(13.406)^4} = \frac{47030.75}{32299.58} = 1.456$$

إذا شكل توزيع بيانات الدرجات مفرطح.

## 4/5 مقاييس أخرى لوصف البيانات

هناك مقاييس أخرى يمكن استخدامها في وصف البيانات ، من حيث درجة تشتت البيانات،

ومدى انتشارها، ومن هذه المقاييس ، ما يلي :

### Variation Coefficient **1/4/5** معامل الاختلاف

أحد مقاييس المستخدمة لقياس درجة التشتت، وفيه يحسب قيمة التشتت كنسبة مئوية من قيمة

مقياس الزعة المركزية ، ومن ثم يفضل استخدام معامل الاختلاف عند مقارنة درجة تشتت بيانات مجموعتين أو أكثر مختلفة لها وحدات قياس مختلفة، بدلا من الانحراف المعياري ، أو الانحراف الربيعي ،

لأن معامل الاختلاف يعتمد على التغيرات النسبية في القيم عن مقياس التزعة المركزية، بينما يعتمد الانحراف المعياري أو الانحراف الربيعي على التغيرات المطلقة للقيم، فعند مقارنة درجة تشتت بيانات الأطوال بالسنتيمتر، وبيانات الأوزان بالكيلوجرام، لا يمكن الاعتماد على الانحراف المعياري في هذه المقارنة، وإنما يستخدم معامل الاختلاف، ومن ثم يطلق عليه بمعامل الاختلاف النسبي، وفيما يلي بعض هذه المعاملات.

### • معامل الاختلاف النسبي

ويحسب معامل الاختلاف النسبي بتطبيق المعادلة التالية:

$$v.c = \frac{S}{\bar{X}} \times 100 \quad (7-5)$$

### • معامل الاختلاف الربيعي

ويحسب هذا المعامل بتطبيق المعادلة التالية:

$$v.c_q = \frac{(Q_3 - Q_1)/2}{Med} \times 100 \quad (8-5)$$

مثال (2-5)

تم اختيار مجموعتين من الأغنام النامية في أحد المزارع، وتم استخدام عليقة معينة لتسمين المجموعة الأولى، بينما تم استخدام عليقة أخرى لتسمين المجموعة الثانية، وبعد فترة زمنية تم جمع بيانات عن أوزان المجموعتين بالكيلوجرام، وتم الحصول على المقاييس التالية.

المقاييس	المجموعة الأولى	المجموعة الثانية
$\bar{X} =$	173	198
$S =$	23	25

والمطلوب مقارنة درجة تشتت المجموعتين:

الحل:

• معامل الاختلاف النسبي للمجموعة الأولى:

$$v.c_1 = \frac{S}{\bar{X}} \times 100 = \frac{23}{173} \times 100 = 13.3\%$$

• معامل الاختلاف النسبي للمجموعة الثانية:

$$v.c_2 = \frac{S}{\bar{X}} \times 100 = \frac{25}{195} \times 100 = 12.8\%$$



يلاحظ أن درجة تشتت أوزان المجموعة الثانية أقل من درجة تشتت أوزان المجموعة الأولى.

## 2/4/5 تقدير مدى الانحراف المعياري

يمكن قياس درجة تشتت البيانات من خلال تقدير المدى الذي يقع داخله الانحراف المعياري

وهو:

$$\frac{\text{المدى}}{4} > \text{الانحراف المعياري} > \frac{\text{المدى}}{6} \quad (9-5)$$

$$\frac{Rang}{6} < \hat{S} < \frac{Rang}{4}$$

وإذا كان المدى الذي يقع فيه الانحراف المعياري صغير دل ذلك على أن تشتت البيانات صغير، أما إذا كان المدى كبير دل ذلك على وجود تشتت كبير في البيانات، وإذا وقع الانحراف المعياري خارج المدى دل ذلك على وجود قيم شاذة.

## 3/4/5 الدرجة المعيارية Standardized degree

تقيس الدرجة المعيارية لقيمة معينة عدد وحدات الانحراف المعياري التي تزيد بها تقلل بها هذه القيمة عن الوسط الحسابي، فإذا كان  $x_1, x_2, \dots, x_n$  هي قيم المشاهدات، وعددتها  $n$ ، وكان  $\bar{x}$  هو الوسط الحسابي لهذه القيم،  $S$  هو الانحراف المعياري، فإن الدرجة المعيارية للقيمة  $x$ ، ويرمز لها بالرمز  $Z$ ، تحسب باستخدام المعادلة التالية:

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{S} \quad (10-5)$$

ويمكن استخدام هذه الدرجة في مقارنة قيمتين أو أكثر مختلفة من حيث وحدات القياس.

### مثال (3-5)

في المثال (2-5) السابق إذا تم اختيار أحد الأغنام من المجموعة الأولى بعد تطبيق البرنامج، ووجد أن وزنه 178 كيلوجرام، وبالمثل أحد الأغنام من المجموعة الثانية، ووجد أن وزنه 180 كيلوجرام، قارن بين هذين القيمتين من حيث أهمية كل منها في المجموعة التي تنتمي إليها.

### الحل

البيانات المتاحة عن كل من المجموعتين هي:

	المجموعة الأولى	المجموعة الثانية
$\bar{x} =$	173	198
$S =$	23	25

القيمة.	178	180
---------	-----	-----

للمقارنة بين الوجدتين من حيث أهمية وزن كل منها في المجموعة التي تنتمي إليها، يتم حساب الدرجة المعيارية لوزن كل منها، بتطبيق المعادلة (5-10).

- الدرجة المعيارية لوزن الوحدة المسحوبة من المجموعة الأولى (178 Kg.) هي:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s} = \frac{178 - 173}{23} = 0.22$$

- الدرجة المعيارية لوزن الوحدة المسحوبة من المجموعة الثانية (180 Kg.) هي:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s} = \frac{180 - 198}{25} = -0.75$$

- نجد أن الوزن 178 كيلوجرام يزيد عن الوسط الحسابي بـ 0.22 انحراف معياري، بينما نجد أن الوزن 180 كيلوجرام يقل عن الوسط الحسابي بـ 0.75 انحراف معياري. ومن ثم الوزن الأول أهميته النسبية أعلى من الوزن الثاني.

#### 4/4/5 القاعدة العملية


إذا كان لدينا المشاهدات التالية:  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ، وكان  $\bar{x}$  هو الوسط الحسابي لهذه المشاهدات،  $s$  هو الانحراف المعياري لها، يكون منحنى توزيع هذه المشاهدات متماثل، إذا تحقق الآتي:

- 68% تقريبا من قيم هذه المشاهدات تتراوح بين  $\bar{x} \pm s$ .
- 95% تقريبا من قيم هذه المشاهدات تتراوح بين  $\bar{x} \pm 2s$ .
- 99% تقريبا من قيم هذه المشاهدات تتراوح بين  $\bar{x} \pm 3s$ .

ويمكن بيان ذلك من الشكل التالي:

شكل (5-3)

شكل توزيع القيم طبقا للقاعدة العملية



#### 5/4/4 القاعدة النظرية

تسمى هذه القاعدة بقاعدة "تشيبشيف"، وفكرة هذه القاعدة: في أي توزيع من التوزيعات

النظرية، فإنه على الأقل  $(1 - 1/k^2) \%$  من قيم المشاهدات تقع في المدى  $\bar{x} \pm ks$ ،  $k > 1$ .

وطبقا لهذه القاعدة، فإنه على الأقل 75% من قيم المشاهدات تقع في المدى  $\bar{x} \pm 2s$ ، على

الأقل 89% من قيم المشاهدات تقع في المدى  $\bar{x} \pm 3s$ .

## 6/4/5 شكل " بوكس " Box Plot

شكل " بوكس " البياني هو صندوق يشبه المستطيل، بداية حافته اليسرى هو الربع الأول  $Q_1$  ونهاية حافته اليمنى هو الربع الثالث  $Q_3$  ، ويقسم الربع الثاني (الوسيط)  $Med$  المستطيل إلى جزأين، ويخرج من كل حافة من حافته شعيرة، والشكل التالي يبين رسمه " بوكس " البياني:

شكل (4-5)  
رسمه بوكس البياني




ويمكن استخدام شكل " بوكس " البياني، أعلاه في وصف البيانات من حيث الآتي:

- 1- من حيث التماثل: إذا كان الوسيط  $Med$  يقع في المنتصف على بعد متساوي من الربعين  $Q_3$  ،  $Q_1$  كان التوزيع متماثلاً ، وإذا كان الوسيط  $Med$  أقرب إلى الربع الأول  $Q_1$  من الربع الثالث  $Q_3$  كان التوزيع موجب الالتواء ، وأما إذا كان الوسيط  $Med$  أقرب إلى الربع الثالث  $Q_3$  من الربع الأول  $Q_1$  كان التوزيع سالب الالتواء . ويظهر ذلك كما في الشكل التالي :

شكل (5-5)


وصف شكل الالتواء باستخدام رسمه بوكس البياني



- 2- من حيث تركيز البيانات: إذا كان الصندوق  $Box$  ضيق دل ذلك على تركيز نسبة كبيرة من البيانات حول الوسيط، وإذا كان الصندوق واسع دل ذلك على انخفاض نسبة تركيز البيانات حول الوسيط، والشكل التالي يبين ذلك.

شكل (6-5)


وصف درجة تركيز البيانات باستخدام رسمه بوكس البياني



- 3- من حيث وجود قيم شاذة: إذا وقعت قيم بعض المشاهدات خارج الحد الأدنى والأعلى الشاذ ،

كانت هذه القيم شاذة ، وتظهر هذه القيم على الرسم في شكل نجوم (\*) ، والشكل التالي يبين طريقة عرض القيم الشاذة الدنيا والعليا على الرسم .  
شكل (5-7)

تحديد القيم الشاذة باستخدام رصمة بوكس البياني



### طريقة حساب حدي القيم الشاذة

لحساب الحد الأدنى والحد الأعلى للقيم الشاذة، يتبع الخطوات التالية:

- حساب الانحراف الرباعي:  $Q = (Q_3 - Q_1) / 2$
  - حساب الحد الأدنى للقيم الشاذة (Low)، وهو:  $Low = Q_1 - 3Q$
  - حساب الحد الأعلى للقيم الشاذة (Upp)، وهو:  $UPP = Q_3 + 3Q$
- وإذا وقعت قيم خارج الحدين تعتبر هذه القيم من القيم الشاذة.

### مثال (5-4)

فيما يلي الإنفاق الاستهلاكي بالألف ريال خلال الشهر لعينة حجمها 12 أسرة:

6 10 18 3 9 10 5 6 11 8 2 7

والمطلوب:

- 1- رسم شكل "بوكس" البياني
- 2- اكتب تحليل وصفي لهذه البيانات.

### الحل

1- رسم شكل " بوكس البياني "

- ترتيب القيم تصاعديا .

2 3 5 6 6 7 8 9 10 10 11 18

- تحديد أقل وأعلى إنفاق استهلاكي، وحساب الرباعيات:

$$Min = 2 \quad Max = 18$$

الرباعي الأدنى  $Q_1$  :

$$\text{موقع الرباعي} = (n+1)(1/4) = (13/4) = 3.25$$

$$Q_1 = 5 + 0.25(6 - 5) = 5.25 \text{ : إذا قيمة } Q_1 \text{ هي:}$$

الوسيط  $Med$  :

موقع الوسيط  $(n+1)(1/2)=(13/2)=6.5$

إذا قيمة Med هي:  $Med = 7 + 0.5(8-7) = 7.5$

الرباعي الأعلى  $Q_3$ :

موقع الربعي  $(n+1)(3/4)=(13)(3/4)=9.75$

إذا قيمة  $Q_3$  هي:  $Q_3 = 10 + 0.75(10-10) = 10$

• حساب الحدين الأعلى والأدنى الشاذ .

الانحراف الربيعي:  $Q = (10 - 5.25) / 2 = 2.375$


الحد الأدنى للقيم الشاذة:

$$Low = Q_1 - 3Q = 5.25 - 3(2.375) = -1.875$$

الحد الأعلى للقيم الشاذة:

$$Upp = Q_3 + 3Q = 10 + 3(2.375) = 17.125$$

• رسم شكل " بوكس "



2- تحليل وصفي من خلال الشكل أعلاه:

- درجة التماثل: التوزيع قريب جدا من التماثل لوقوع الوسيط في المنتصف .
  - تركيز البيانات: حوالي 60% من القيم تتركز حول الوسيط.
  - القيم الشاذة: توجد قيمة شاذة عليا هي القيمة 18.
- ويمكن استخدام شكل " بوكس " البياني لمقارنة مجموعتين أو أكثر .

## الفصل السادس

### الارتباط والانحدار الخطي البسيط


#### 1/6 مقدمة

في الفصول الثلاث السابقة تم عرض بعض المقاييس الوصفية، مثل مقاييس النزعة المركزية، والتشتت، ومقاييس الالتواء والتف الأرقام القياسية رطح، وغيرها من المقاييس الأخرى والتي يمكن من خلالها وصف شكل توزيع البيانات التي تم جمعها عن متغير واحد، ومنتقل من التعامل مع متغير واحد إلى التعامل مع متغيرين أو أكثر، ويتناول هذا الفصل دراسة وتحليل العلاقة بين متغيرين، وذلك باستخدام بعض طرق التحليل الإحصائي مثل تحليل الارتباط، والانحدار الخطي البسيط، فإذا كان اهتمام الباحث هو دراسة العلاقة بين متغيرين استخدم لذلك أسلوب تحليل الارتباط، وإذا كان اهتمامه بدراسة أثر أحد المتغيرين على الآخر استخدم لذلك أسلوب تحليل الانحدار، ومن الأمثلة على ذلك:

- 1- الإنفاق، والدخل العائلي.
  - 2- سعر السلعة، والكمية المطلوبة منها.
  - 3- الفترة الزمنية لتخزين الخبز، وعمق طراوة الخبز.
  - 4- تقديرات الطلاب في مقرر الإحصاء، وتقديراتهم في مقرر الرياضيات.
  - 5- كميات السماد المستخدمة، وكمية الإنتاج من محصول معين تم تسميده بهذا النوع من السماد.
  - 6- عدد مرات ممارسة نوع معين من الرياضة البدنية، ومستوى الكولسترول في الدم.
  - 7- وزن الجسم، وضغط الدم.
- والأمثلة على ذلك في المجال التطبيقي كثيرة، فإذا كان لدينا المتغيرين  $(x, y)$ ، وتم جمع بيانات عن أزواج قيم هذين المتغيرين، وتم تمثيلها بيانيا فيما يسمى بشكل الانتشار، فإن العلاقة بينها تأخذ أشكالا مختلفة على النحو التالي :

شكل(1-6)

شكل الانتشار لبيان نوع العلاقة بين  $x, y$



#### 2/6 الارتباط الخطي البسيط Simple Correlation

إذا كان الغرض من التحليل هو تحديد نوع وقوة العلاقة بين متغيرين ، يستخدم تحليل الارتباط ، وأما إذا كان الغرض هو دراسة وتحليل أثر أحد المتغيرين على الآخر ، يستخدم تحليل الانحدار، وفي هذا الفصل يتم عرض أسلوب تحليل الارتباط الخطي البسيط، أي في حالة افتراض أن العلاقة بين المتغيرين تأخذ الشكل الخطي ، وسوف يجرى حسابه في حالة البيانات الكمية ، والبيانات الوصفية المقاسة بمقيار ترتيبي.

## 1/2/6 الغرض من تحليل الارتباط الخطي البسيط

الغرض من تحليل الارتباط الخطي البسيط هو تحديد نوع وقوة العلاقة بين متغيرين، ويرمز له في حالة المجتمع بالرمز  $\rho$  (رو)، وفي حالة العينة بالرمز  $r$ ، وحيث أننا في كثير من النواحي التطبيقية نتعامل مع بيانات عينة مسحوبة من المجتمع، سوف نهتم بحساب معامل الارتباط في العينة  $r$  كتقدير لمعامل الارتباط في المجتمع، ومن التحديد السابق للغرض من معامل الارتباط، نجد أنه يركز على نقطتين هما:

- نوع العلاقة: وتأخذ ثلاث أنواع حسب إشارة معامل الارتباط كما يلي:
  - 1- إذا كانت إشارة معامل الارتباط سالبة ( $r < 0$ ) توجد علاقة عكسية بين المتغيرين، بمعنى أن زيادة أحد المتغيرين يصاحبه انخفاض في المتغير الثاني، والعكس.
  - 2- إذا كانت إشارة معامل الارتباط موجبة ( $r > 0$ ) توجد علاقة طردية بين المتغيرين، بمعنى أن زيادة أحد المتغيرين يصاحبه زيادة في المتغير الثاني، والعكس.
  - 3- إذا كان معامل الارتباط قيمته صفراً ( $r = 0$ ) دل ذلك على انعدام العلاقة بين المتغيرين.
- قوة العلاقة: ويمكن الحكم على قوة العلاقة من حيث درجة قربها أو بعدها عن ( $\pm 1$ )، حيث أن قيمة معامل الارتباط تقع في المدى ( $-1 < r < 1$ )، وقد صنف بعض الإحصائيين درجات لقوة العلاقة يمكن تمثيلها على الشكل التالي:

شكل (2-6)

درجات قوة معامل الارتباط

ارتباط عكسي					ارتباط طردي					
قوي جدا	قوي	متوسط	ضعيف	ضعيف جدا	ضعيف جدا	ضعيف	متوسط	قوي	قوي جدا	
-1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.3	0	0.3	0.5	0.7	0.9	1
نام				نام						نام

## 2/2/6 معامل الارتباط الخطي البسيط " لبيرسون " Pearson

في حالة جمع بيانات عن متغيرين كميين  $(y, x)$ ، يمكن قياس الارتباط بينهما، باستخدام طريقة "بيرسون" Pearson، ومن الأمثلة على ذلك: قياس العلاقة بين الوزن والطول، والعلاقة بين الإنتاج والتكلفة، والعلاقة بين الإنفاق الاستهلاكي والدخل، والعلاقة بن الدرجة التي حصل عليها الطالب وعدد ساعات الاستذكار، وهكذا الأمثلة على ذلك كثيرة.

ولحساب معامل الارتباط في العينة، تستخدم صيغة "بيرسون" التالية :

$$r = \frac{S_{xy}}{S_x S_y} = \frac{\frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{(n-1)}}{\sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{(n-1)}} \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{(n-1)}}} \quad (1-6)$$

حيث أن :

$$S_{xy} = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{(n-1)} \text{ : هو التغير بين } (y, x)$$

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{(n-1)}} \text{ : هو الانحراف المعياري لقيم } (x)$$

$$S_y = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{(n-1)}} \text{ : هو الانحراف المعياري لقيم } (y)$$

ويمكن اختصار الصيغة السابقة على النحو التالي:

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2}} \quad (2-6)$$

مثال (6-1)

فيما يلي المساحة المنزوعة بالأعلاف الخضراء بالألف هكتار، وإجمالي إنتاج اللحوم بالألف طن، خلال الفترة من 1995 حتى عام 2002.

السنة	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
المساحة	305	313	297	289	233	214	240	217
الكمية	592	603	662	607	635	699	719	747

والمطلوب: حساب معامل الارتباط بين المساحة والكمية، وما هو مدلوله ؟

الحل



## 114

- يفرض أن  $(x)$  هي المساحة المنزرعة،  $(y)$  هي الكمية، ولحساب معامل الارتباط بين  $(y, x)$  يتم تطبيق المعادلة (2-6)، وذلك على النحو التالي:
- حساب الوسط الحسابي لكل من المساحة، والكمية  $(\bar{y}, \bar{x})$ .

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{2108}{8} = 263.5, \quad \bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{5264}{8} = 658$$

- حساب المجاميع

$x$	$y$	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$	$y - \bar{y}$	$(y - \bar{y})^2$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$
305	592	41.5	1722.25	-66	4356	-2739
313	603	49.5	2450.25	-55	3025	-2722.5
297	662	33.5	1122.25	4	16	134
289	607	25.5	650.25	-51	2601	-1300.5
233	635	-30.5	930.25	-23	529	701.5
214	699	-49.5	2450.25	41	1681	-2029.5
240	719	-23.5	552.25	61	3721	-1433.5
217	747	-46.5	2162.25	89	7921	-4138.5
2108	5264	0	12040	0	23850	-13528

$$\sum (x - \bar{x})^2 = 12040, \quad \sum (y - \bar{y})^2 = 23850,$$

$$\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y}) = -13528$$

إذا معامل الارتباط قيمته هي:

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y - \bar{y})^2}} = \frac{-13528}{\sqrt{12040} \sqrt{23850}}$$

$$= \frac{-13528}{(109.727)(154.434)} = \frac{-13528}{16945.619} = -0.798$$

- يوجد ارتباط عكسي قوي بين المساحة المنزرعة، وكمية إنتاج اللحوم.

### تبسيط العمليات الحسابية:

في بعض الأحيان، يكون استخدام صيغة المعادلة (2-6) في غاية الصعوبة، خاصة إذا لازم العمليات الحسابية قيما كسرية، من أجل ذلك يمكن تبسيط الصيغة (2-6) إلى صيغة أسهل تعتمد على مجموع القيم وليس على انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، وهذه الصيغة هي:

$$r = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right)\left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}} \quad (3-6)$$

وبالتطبيق على بيانات المثال السابق ، يتبع الآتي :

• حساب المجاميع:

x	y	xy	x <sup>2</sup>	y <sup>2</sup>
305	592	180560	93025	350464
313	603	188739	97969	363609
297	662	196614	88209	438244
289	607	175423	83521	368449
233	635	147955	54289	403225
214	699	149586	45796	488601
240	719	172560	57600	516961
217	747	162099	47089	558009
2108	5264	1373536	567498	3487562

المجاميع المطلوبة
$\sum x = 2108$ , $\sum y = 5264$
$\sum xy = 1373536$
$\sum x^2 = 567498$
$\sum y^2 = 3487562$

• حساب معامل الارتباط:

باستخدام المجاميع السابقة، وبالتطبيق على المعادلة (3-6) أعلاه، نجد أن معامل الارتباط قيمته هي:

$$r = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right)\left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}}$$

$$= \frac{1373536 - \frac{(2108)(5264)}{8}}{\sqrt{\left(567498 - \frac{(2108)^2}{8}\right)\left(3487562 - \frac{(5264)^2}{8}\right)}}$$

$$= \frac{-13528}{\sqrt{(12040)(23850)}} = \frac{-13528}{16945.619} = -0.798$$

وهي نفس النتيجة السابقة:

3/2/6 معامل ارتباط الرتب (اسبيرمان) Spearman

إذا كانت الظاهرة محل الدراسة تحتوي على متغيرين وصفيين ترتيبيين، ومثال على ذلك قياس العلاقة بين تقديرات الطلبة في مادتين ، أو العلاقة بين درجة تفضيل المستهلك لسلعة معينة ، ومستوى الدخل، فإنه يمكن استخدام طريقة "بيرسون" السابقة في حساب معامل ارتباط يعتمد على رتب مستويات المتغيرين كبديل للقيم الأصلية ، ويطلق على هذا المعامل "معامل ارتباط اسبيرمان" Spearman ، ويعبر عنه بالمعادلة التالية :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)} \quad (6-1)$$

حيث أن  $d$  هي الفرق بين رتب مستويات المتغير الأول  $X$ ، ورتب مستويات المتغير الثاني  $Y$  ، أي أن :  $d = R_x - R_y$  .

مثال (6-2)

فيما يلي تقديرات 10 طلاب في مادتي الإحصاء، والاقتصاد:

تقديرات إحصاء	أ	ج+	د	د+	ب+	ج+	أ+	ب	ب+	ب+
تقديرات اقتصاد	أ+	د	ج	ج	أ	ب	ب+	ب	ج	ب

والمطلوب:

1- احسب معامل الارتباط بين تقديرات الطلبة في المقررين.

2- وما هو مدلوله ؟

الحل

1- بفرض أن  $X$  هي تقديرات الإحصاء،  $Y$  هي تقديرات الاقتصاد، يمكن حساب معامل الارتباط بينهما باستخدام المعادلة (6-4)، وذلك بإتباع الآتي:

الرتب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
تقديرات إحصاء	أ+	أ	ب+	ب+	ب+	ب	ج+	ج+	د	د
رتب $X$	1	2	$(3+4+5)/3=4$			6	$(7+8)/2=7.5$		9	10
تقديرات اقتصاد	أ+	أ	ب+	ب	ب	ب	ج-	ج-	ج-	د
رتب $Y$	1	2	3	$(4+5+6)/3=5$			$(7+8+9)/3=8$			10

• إذا يمكن حساب المجموع:  $\sum d^2$  كما يلي:

$x$	$y$	رتب $x$	رتب $y$	$d$	$d^2$	$\sum d^2 = 44.5$
-----	-----	---------	---------	-----	-------	-------------------

أ	أ <sup>+</sup>	2	1	1	1
ج <sup>+</sup>	د	7.5	10	-2.5	6.25
د	ج	10	8	2	4
د <sup>+</sup>	ج	9	8	1	1
ب <sup>+</sup>	أ	4	2	2	1
ج <sup>+</sup>	ب	7.5	5	2.5	6.25
أ <sup>+</sup>	ب <sup>+</sup>	1	3	-2	4
ب	ب	6	5	1	1
ب <sup>+</sup>	ج	4	8	-4	16
ب <sup>+</sup>	ب	4	5	-1	1
					44.5

• معامل الارتباط هو:

$$r = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$= 1 - \frac{6(44.5)}{10(10^2 - 1)} = 1 - \frac{267}{990}$$

$$= 1 - 0.2697 = 0.7303$$

2- مدلول معامل الارتباط :

بما أن  $r = 0.703$  ، ويدل ذلك على وجود ارتباط طردي قوي بين تقديرات الطالب في مادة

الإحصاء ، ومادة الاقتصاد .

ملحوظة:- يمكن استخدام صيغة معامل ارتباط "اسبيرمان" في حساب الارتباط بين متغيرين كميين، حيث يتم استخدام رتب القيم التي يأخذها المتغير، ونترك للطالب القيام بحساب معامل ارتباط الرتب بين المساحة والكمية في مثال (5-1) السابق، وعليه أن يقوم بتفسير النتيجة: (معاونة :  $\sum d^2 = 148$ )

### 3/6 الانحدار الخطي البسيط Simple Regression

إن الغرض من استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط، هو دراسة وتحليل أثر متغير كمي

على متغير كمي آخر، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

- دراسة أثر كمية السماد على إنتاجية الدونم.
- دراسة أثر الإنتاج على التكلفة.
- دراسة أثر كمية البروتين التي يتناولها الأبقار على الزيادة في الوزن.
- أثر الدخل على الإنفاق الاستهلاكي.

وهكذا هناك أمثلة في كثير من النواحي الاقتصادية، والزراعية، والتجارية، والعلوم السلوكية، وغيرها من

المجالات الأخرى.


### 1/3/6 نموذج الانحدار الخطي

في تحليل الانحدار البسيط، نجد أن الباحث يهتم بدراسة أثر أحد المتغيرين ويسمى بالمتغير المستقل أو المتنبأ منه، على المتغير الثاني ويسمى بالمتغير التابع أو المتنبأ به، ومن ثم يمكن عرض نموذج الانحدار الخطي في شكل معادلة خطية من الدرجة الأولى، تعكس المتغير التابع كدالة في المتغير المستقل كما يلي:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + e \quad (5-6)$$

حيث أن:

- $y$  : هو المتغير التابع (الذي يتأثر)
- $x$  : هو المتغير المستقل (الذي يؤثر)
- $\beta_0$  : هو الجزء المقطوع من المحور الرأسي  $y$  ، وهو يعكس قيمة المتغير التابع في حالة انعدام قيمة المتغير المستقل  $x$  ، أي في حالة  $x = 0$
- $\beta_1$  : ميل الخط المستقيم  $(\beta_0 + \beta_1 x)$  ، ويعكس مقدار التغير في  $y$  إذا تغيرت  $x$  بوحدة واحدة.
- $e$  : هو الخطأ العشوائي، والذي يعبر عن الفرق بين القيمة الفعلية  $y$  ، والقيمة المقدرة  $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$  ، أي أن :  $e = y - (\beta_0 + \beta_1 x)$  ، ويمكن توضيح هذا الخطأ على الشكل التالي لنقط الانتشار.



### 2/3/6 تقدير نموذج الانحدار الخطي البسيط

يمكن تقدير معاملات الانحدار  $(\beta_1, \beta_0)$  في النموذج (5-6) باستخدام طريقة المربعات الصغرى، وهذا التقدير هو الذي يجعل مجموع مربعات الأخطاء العشوائية

$\sum e^2 = \sum (y - (\beta_0 + \beta_1 x))^2$  أقل ما يمكن، وبحسب هذا التقدير بالمعادلة التالية:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad (6-6)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

حيث أن  $\bar{x}$  هو الوسط الحسابي لقيم  $x$ ،  $\bar{y}$  هو الوسط الحسابي لقيم  $y$ ، وتكون القيمة المقدرة للمتغير التابع هو:  $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ ، ويطلق على هذا التقدير "تقدير معادلة انحدار  $y$  على  $x$ ".

### مثال (3-6)

فيما يلي بيانات عن كمية البروتين اليومي بالجرام التي يحتاجها العجل الرضيع، ومقدار الزيادة في وزن العجل بالكجم، وذلك لعينة من العجول الرضيعة حجمها 10.


كمية البروتين	10	11	14	15	20	25	46	50	59	70
الزيادة في الوزن	10	10	12	12	13	13	19	15	16	20

والمطلوب :

- 1- ارسم نقط الانتشار، وما هو توقعاتك لشكل العلاقة ؟
- 2- قدر معادلة انحدار الوزن على كمية البروتين.
- 3- فسر معادلة الانحدار.
- 4- ما هو مقدار الزيادة في الوزن عند إعطاء العجل 50 جرام من البروتين ؟ وما هو مقدار الخطأ العشوائي؟
- 5- ارسم معادلة الانحدار على نقط الانتشار في المطلوب (1).

الحل

1- رسم نقط الانتشار:



من المتوقع أن يكون لكمية البروتين أثر طردي (إيجابي) على مقدار الزيادة في الوزن.

2- تقدير معادلة الانحدار.

بفرض أن  $x$  هي كمية البروتين،  $y$  هي مقدار الزيادة في الوزن، يمكن تطبيق المعادلتين في (6-6)، ومن ثم يتم حساب المجاميع التالية:

كمية البروتين $x$	الزيادة في الوزن $y$	$x y$	$x^2$	المجاميع المطلوبة
10	10	100	100	$\sum x = 320$
11	10	110	121	$\sum y = 140$
14	12	168	196	$\sum xy = 5111$
15	12	180	225	$\sum x^2 = 14664$
20	13	260	400	
25	13	325	625	
46	19	874	2116	
50	15	750	2500	إذا الوسط الحسابي:
59	16	944	3481	$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{320}{10} = 32$
70	20	1400	4900	$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{140}{10} = 14$
320	140	5111	14664	

• بتطبيق المعادلة الأولى في (6-6) يمكن حساب  $\hat{\beta}_1$  كما يلي:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{(10)(5111) - (320)(140)}{(10)(14664) - (320)^2}$$

$$= \frac{6310}{44240} = 0.1426$$

• بتطبيق المعادلة الثانية في (6-6) يمكن حساب  $\hat{\beta}_0$  كما يلي:

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 14 - (0.1426)(32) = 9.4368$$

• إذا معادلة الانحدار المقدرة، هي:

$$\hat{y} = 9.44 + 0.143x$$

3- تفسير المعادلة:

• الثابت  $\hat{\beta}_0 = 9.44$  يدل على أنه في حالة عدم استخدام البروتين في التغذية، فإن الوزن يزيد 9.44 كجم.

## 121

- معامل الانحدار  $\hat{\beta}_1 = 0.143$  : يدل على أنه كلما زادت كمية البروتين جرام واحد، حدث زيادة في وزن العجل بمقدار 0.143 كجم، أي زيادة مقدارها 143 جرام.

4- مقدار الزيادة في الوزن عند  $x = 50$  هو:

$$\hat{y} = 9.44 + 0.143(50) = 16.59$$

وأما ومقدار الخطأ العشوائي هو:


$$\hat{e}_{x=50} = y_{x=50} - \hat{y}_{x=50} = 15 - 16.59 = -1.59$$

5- رسم معادلة الانحدار على نقط الانتشار.

يمكن رسم معادلة خط مستقيم إذا علم نقطتين على الخط المستقيم.

$x$	50	10
$\hat{y}$	16.59	10.87

إذا معادلة الانحدار هي:





## الفصل السابع الارقام القياسية

## المحتويات

أولا - مقدمة:

ثانيا - تركيب الأرقام القياسية:

أ. الصيغ البسيطة للأرقام القياسية:

1. المناسب.
2. الطريقة التجميعية البسيطة.
3. الوسط الحسابي لمناسيب الأسعار.

ب . الصيغ المرجحة للأرقام القياسية:

- 1 . رقم لاسبير.
- 2 . رقم باشي.
- 3 . الرقم القياسي الأمثل.
- 4 . رقم مارشال – إدجورث القياسي.
- 5 . الوسط المرجح للمناسيب.

## الأرقام القياسية

### أولا - مقدمة:

الرقم القياسي هو عبارة عن مؤشر إحصائي يقيس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة، سعراً، كمية، قيمة أو أجراً، بالنسبة لأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكاناً جغرافياً معيناً، حيث تؤخذ قيمة هذه الظاهرة كأساس لحساب الرقم القياسي. ويسمى الوقت أو المكان الذي تنسب إليه الظاهرة بفترة أو مكان الأساس، كما يسمى الوقت أو المكان الذي تنسبه إلى فترة أو مكان، المقارنة.

يرجع استخدام الأرقام القياسية إلى أكثر من قرنين من الزمن، حيث استخدمها الإحصائي الإيطالي كارلي (1764) لمقارنة الأسعار في إيطاليا لسنة 1750 بالأسعار في سنة 1500. ثم شاع استخدامها بصورة أوسع منذ ذلك الحين، حيث اهتمت الحكومات بتركيب وحساب بعض الأرقام القياسية. ومن الأمور الهامة عند تركيب الرقم القياسي اختيار فترة الأساس أو مكان الأساس التي تعتمد لتركيب الرقم. وعادة ما تكون فترة الأساس سابقة لفترة المقارنة. كما يجب اختيار فترة أو مكان الأساس بحيث تكون متميزة بالاستقرار الاقتصادي وخالية من الاضطرابات العنيفة التي قد تتعرض لها الظاهرة كالحروب والأزمات الاقتصادية، كما يفضل أن لا تكون بعيدة جداً عن سنوات المقارنة (علي أبو القاسم، 1984).

تستخدم الأرقام الإحصائية في التطبيقات الإحصائية في مجال الدراسات الاقتصادية، حيث يمكن من خلالها التعرف على الأحوال الاقتصادية للدول المختلفة من خلال دراسة التغيرات الاقتصادية في البلد أو البلدان قيد الدراسة، للمساعدة على التنبؤ بما يمكن أن يحدث للمتغيرات المختلفة في المستقبل. كما تستخدم لقياس ظواهر متعددة مثل مقارنة أسعار السلع الغذائية في سنة محددة بسنة أخرى سابقة أو مقارنة إنتاج قطاع اقتصادي معين في دولة ما بنظيره في دولة أخرى، أو للوقوف على التطور الذي طرأ على إنتاج هذا القطاع عبر فترة محددة من الزمن.

ولم تعد تطبيقات الأرقام القياسية مقتصرة على الاقتصاديين في دراساتهم التحليلية، بل أصبحت وسيلة في أيدي المهتمين بالعلوم الاجتماعية والإدارية والزراعية لعمل المقارنات وقياس التغيرات. وهناك أرقام قياسية في ميادين مختلفة مثل الرقم القياسي لأسعار الجملة وأسعار التجزئة، والرقم القياسي للواردات والرقم القياسي للصادرات، كما تؤخذ أرقام قياسية للإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي والأجور وتكلفة المعيشة، ويختلف تركيب كل نوع من هذه الأرقام باختلاف الأهمية النسبية للسلع التي تدخل في تركيب كل رقم.

## ثانيا - تركيب الأرقام القياسية

يمكن تمييز صيغتين أساسيتين من صيغ الأرقام القياسية هما الصيغ البسيطة، والصيغ المرجحة للأرقام القياسية.

أ. الصيغ البسيطة للأرقام القياسية:  
وتشمل ما يلي:

### 1. المناسب :

يعتبر منسوب (Relative) السعر من أبسط الأمثلة للرقم القياسي، وهو نسبة قيمة المتغير في فترة المقارنة إلى قيمة نفس المتغير في فترة الأساس. فإذا كانت  $P_0$  تمثل سعر السلعة خلال فترة الأساس و  $P_n$  سعرها في فترة المقارنة فإن:

$$\frac{P_n}{P_0} = \text{منسوب السعر}$$

ويمكن التعبير عنه على شكل نسبة مئوية بضربه في 100، كما يمكن أن يرمز له بالرمز  $P_{0/n}$ . وتجدر ملاحظة أن منسوب السعر لفترة معينة بالنسبة لنفس الفترة دائماً 100%، بمعنى أن سنة الأساس دائماً 100 وهو ما يكتب عادة في الأدبيات الإحصائية عند الإشارة إلى سنة الأساس بأنها تساوي 100.

مثال على ذلك، إذا كان سعر برميل النفط الخام في سنة 2000 هو 24 دولار وفي سنة 1994 هو 14 دولار، باتخاذ سنة 1994 كنسبة أساس، فإن:

$$\text{منسوب السعر} = \frac{24}{14} \times 100 = 171.4\%$$

هذا يعني إن السعر في عام 2000 قد زاد بنسبة 71.4% عما كان عليه في عام 1994.

في حالة مقارنة كميات السلع بدلاً من أسعار السلع، كما هو الحال بالنسبة لحجم الإنتاج والاستهلاك والتصدير مثلاً، فإننا نتكلم عن مناسيب الكمية كما في حالة الأسعار. فإذا عبرنا عن كمية السلعة المنتجة أو المستهلكة خلال فترة الأساس بالرمز  $q_0$  وعن كمية الإنتاج أو الاستهلاك في فترة المقارنة بالرمز  $q_n$ ، فإن:

$$\frac{q_n}{q_0} = \text{منسوب الكمية أو الحجم} \text{ ويعبر عنه أيضاً على شكل نسبة مئوية.}$$

عندما يكون سعر السلعة  $p$  والكمية المنتجة منها  $q$  فإن القيمة الإجمالية لهذه السلعة هي  $pq$ . وإذا كانت  $p_0$  و  $q_0$  تعبير عن سعر السلعة والكمية المنتجة منها في فترة الأساس، بينما  $p_n$  و  $q_n$  هي السعر والكمية المنتجة على التوالي في سنة المقارنة، فإن القيمة الإجمالية خلال فترة الأساس هي  $V_0$  وخلال فترة المقارنة  $V_n$ ، وعليه فإن:

$$\frac{p_n q_n}{p_0 q_0} = \frac{V_n}{V_0} = \text{منسوب القيمة}$$

## 2 . الطريقة التجميعية البسيطة :

في هذه الطريقة يكون الرقم القياسي عبارة عن مجموع أسعار أو كميات السلع في سنة المقارنة كنسبة مئوية من مجموع أسعارها وكمياتها في سنة الأساس.

$$\frac{\sum p_n}{\sum p_o} = \text{الرقم القياسي التجميعي البسيط}$$

$$\text{مجموع أسعار أو كميات السلع في سنة الأساس.} = \sum p_o$$

$$\text{مجموع أسعار أو كميات نفس السلع في سنة المقارنة.} = \sum p_n$$

مثال: البيانات التالية توضح الكميات المصدرة من مجموعة من السلع في عامي 1985 و 1995:

السلعة	الوحدة	الكمية المصدرة 1985	الكمية المصدرة 1995
أسماك	طن	70	200
إسمنت	طن	20	80
بتزول خام	ألف برميل	400	900

والمطلوب حساب الرقم القياسي التجميعي لكميات تلك المجموعة من السلع .

$$\text{الرقم القياسي التجميعي} = \frac{900 + 80 + 200}{400 + 20 + 70} = \frac{1180}{490} = 240.8\%$$

ويعبر عن النتيجة كنسبة مئوية كما هو الحال بالنسبة للأرقام القياسية بوجه عام. وبالرغم من سهولة هذه الطريقة إلا أن تطبيقها يكتنفه عيبان يجعلان من استخدامها عملية غير مرغوبة. الأول أنها لا تأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للسلع المختلفة، فهي تعطي جميع السلع أوزاناً متساوية في الأهمية، الثاني أنها لا تعير اهتماماً للوحدات المستخدمة في تمييز السعر مثل الغرام والكيلوغرام وغيرها من الوحدات الكمية وهو ما يؤثر على قيمة الرقم القياسي.

## 3 . الوسط الحسابي لمناسيب الأسعار:

هو عبارة عن مجموع مناسيب أسعار السلع مقسوماً على عدد السلع ويعبر عنه كالتالي:

$$\frac{\sum p_n / p_o}{N} = \text{الوسط الحسابي البسيط لمناسيب الأسعار}$$

$$\text{مجموع مناسيب أسعار جميع السلع.} = \sum p_n / p_o$$

$$\text{عدد مناسيب أسعار السلع المستخدمة (عدد السلع).} = N$$

وبتطبيق هذه الصيغة على المثال السابق نجد أن:

$$\frac{\sum q_n / q_o}{N} = \text{الوسط الحسابي لمناسيب الكميات}$$

$$3.04 = \frac{\frac{900}{400} + \frac{80}{20} + \frac{200}{70}}{3}$$

وبضرب هذه النتيجة بـ 100 يصبح الرقم 304%.

وبهذه الطريقة يمكن التخلص من العيب الثاني الموجود في الطريقة التجميعية البسيطة إلا أن العيب الأول المتعلق بالأهمية النسبية لكل سلعة يبقى قائماً.

### ب . الصيغ المرجحة للأرقام القياسية:

للتغلب على مشكلة عيوب الطريقة التجميعية البسيطة، نقوم بترجيح أسعار أو كميات كل سلعة باستخدام معامل معين. ويستخدم عادة كمية السلعة المباعة أو سعرها خلال فترة الأساس أو فترة المقارنة أو سنة نموذجية (قد تكون متوسط عدد من السنوات). وهذه الأوزان تشير إلى الأهمية النسبية للسلعة. كذلك بالنسبة للأجور فإن إجمالي الأجور المدفوعة في كل قطاع تعتبر أوزاناً مناسبة. وهناك ثلاث صيغ للأرقام القياسية المرجحة تعتمد على ما إذا كنا سنستخدم كميات أو أسعار سنة الأساس أو المقارنة أو السنة النموذجية.

#### 1 . رقم لاسبير:

هو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس. وهناك صيغتان لهذا الرقم : الصيغة الأولى هي صيغة الرقم القياسي التجميعي للأسعار، وتكون كما يلي:

$$100 \times \frac{\sum P_n q_o}{\sum P_o q_o} = \text{صيغة لاسبير للأسعار}$$

وفي هذه الصيغة يفترض ثبات أذواق المستهلكين واستمرارهم في استهلاك نفس كميات السلع حتى لو تغيرت أسعارها إرتفاعاً أو إنخفاضاً.

أما الصيغة الثانية فهي صيغة الرقم القياسي التجميعي للكميات وتكون كما يلي:

$$100 \times \frac{\sum q_n P_o}{\sum q_o P_o} = \text{صيغة لاسبير للكميات}$$

ويفترض في هذه الصيغة ثبات الأسعار في فترتي الأساس والمقارنة بغض النظر عن تغير الكميات المستهلكة في الفترتين.

#### 2 . رقم باشي:

هو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة المقارنة. وله أيضاً صيغتان كما في رقم لاسبير:

$$100 \times \frac{\sum P_n q_n}{\sum P_o q_n} = \text{صيغة باشي للأسعار}$$

وهذه الصيغة تقيس التغير في النفقات للحصول على كميات السلع في فترة المقارنة مرجحة بأسعار فترة المقارنة وأسعار فترة الأساس. وبذلك يفترض أن نفس كميات سنة المقارنة كانت قد استهلكت في سنة الأساس وذلك بالرغم من تغير الأسعار، وهو فرض غير مقبول أيضاً.

$$100 \times \frac{\sum q_n P_n}{\sum q_o P_n} = \text{صيغة باشي للكميات}$$

في هذه الصيغة يفترض أن المستهلك يقيم ما يستهلكه في كل من فترتي الأساس والمقارنة بنفس أسعار سنة المقارنة، وهو فرض غير جائز أيضاً.

وبالرغم من الاختلاف بين رقمي لاسبير وباشي الناجم عن اختلاف الأوزان المستخدمة، إلا أن كليهما يشيران إلى الاتجاه نحو التغيير، وأن الرقمين يعتمدان على مقارنة القيم مع اختلاف الغرض المستخدم لحساب القيمة.

### 3 . الرقم القياسي الأمثل:

يتضح مما سبق أن رقم لاسبير يجعل صيغة الرقم القياسي متحيزة إلى أعلى بالنظر إلى أنه مبني على الترجيح بأوزان فترة الأساس، على عكس رقم باشي الذي يستند على الترجيح بأوزان فترة المقارنة مما يدفع صيغة الرقم إلى أسفل. وعليه فقد اقترحت عدة صيغ لمعالجة الفرق بين الترجيحين، وقد كانت صيغة فيشير أهمها، حيث اقترحت صيغة تأخذ الرقمين السابقين بعين الاعتبار لتكوين رقماً قياسياً أمثلاً، ولتأخذ صيغة الوسط الهندسي للصيغتين السابقتين:

$$\frac{\text{رقم لاسبير للأسعار} \times \text{رقم باشي للأسعار}}{100 \times \frac{\sum P_n q_n}{\sum P_o q_n} \times \frac{\sum P_n q_o}{\sum P_o q_o}} = \text{الرقم القياسي الأمثل للأسعار (فيشير)}$$

أما الرقم القياسي الأمثل للكميات فصيغته كما يلي:

$$\frac{\text{رقم لاسبير للكميات} \times \text{رقم باشي للكميات}}{100 \times \frac{\sum q_n P_n}{\sum q_o P_n} \times \frac{\sum q_n P_o}{\sum q_o P_o}} = \text{الرقم القياسي الأمثل للكميات (فيشير)}$$

أي أنه عبارة عن الوسط الهندسي لصيغة لاسبير للكميات مضروبة بصيغة باشي للكميات.

#### 4 . رقم مارشال – إدجورث القياسي:

هو صيغة تجميعية مرجحة باستخدام طريقة السنة النموذجية، وتكون الأوزان في هذه الحالة عبارة عن الوسط الحسابي لكميات سنة الأساس وكميات سنة المقارنة. فتكون الكمية النموذجية

$$\frac{1}{2}(q_n + q_o) = (q_t)$$

تكتب صيغة مارشال ادجورث كما يلي:

$$\frac{\sum p_n(q_o + q_n)}{\sum p_o(q_o + q_n)} = \text{الرقم القياسي لمارشال - إدجورث القياسي للأسعار}$$

#### 5 . الوسط المرجح للمناسيب:

يستخدم للتغلب على العيوب الموجودة في طريقة الوسط البسيط للمناسيب. والوسط الحسابي المرجح هو الأكثر شيوعاً رغم إمكانية استخدام أوساطا أخرى مرجحة مثل الوسط الهندسي المرجح. وبهذه الطريقة يرجح كل منسوب سعر بالقيمة الإجمالية للسلعة بدلاً من الوحدات النقدية. وحيث أنه يمكن الحصول على قيمة للسلعة بضرب السعر  $p$  في الكمية  $q$ ، فإن الأوزان التي تعطى بالصيغة هي  $pq$ .

تستخدم ثلاثة صيغ من الوسط الحسابي المرجح للمناسيب، تختلف باختلاف سنة الترجيح المستخدمة، سواء كانت سنة الأساس أو المقارنة أو السنة النموذجية والتي يعبر عنها بالقيم  $p_oq_o$ ،  $p_nq_n$  و  $p_tq_t$  على التوالي.

\* الوسط الحسابي المرجح لمناسيب الأسعار باستخدام قيمة سنة الأساس كأوزان ترجيحية:

$$\frac{\sum (p_n / p_o)(p_o q_o)}{\sum p_o q_o} = \frac{\sum p_n q_o}{\sum p_o q_o}$$
 وهو ما يطابق نفس صيغة لاسبيرر الواردة آنفاً.

\* الوسط الحسابي المرجح لمناسيب الأسعار باستخدام قيمة سنة المقارنة كأوزان ترجيحية:

$$\frac{\sum (p_n / p_o)(p_n q_n)}{\sum p_n q_n}$$

\* الوسط الحسابي المرجح لمناسيب الأسعار باستخدام قيم سنة نموذجية كأوزان ترجيحية.



## أولاً : أمثلة توضيحية عن مقرر الإحصاء الوصفي للاقتصاديين

س 1/ البيانات التالية تمثل ألوان السيارات لعينة من 25 طالب :

احمر	اسود	احمر	ابيض	ازرق
اسود	ابيض	فضي	احمر	ابيض
فضي	اسود	ابيض	ابيض	احمر
ازرق	فضي	ابيض	ابيض	اسود
فضي	ازرق	احمر	ابيض	ابيض

المطلوب وضع هذه البيانات في صورة جدول بسيط ، مبينا التكرار المئوي والتكرار النسبي.

س2/ أجرى بحث شمل 20 أسرة وسجل لكل أسرة عدد أفرادها وحصلنا على النتائج التالية:

2	4	3	1	0	2	0	2	1	4
3	1	2	2	3	4	3	4	0	1

اعرض هذه البيانات في صورة جدول مبينا فيه التكرار المئوي والتكرار النسبي .

س3/ البيانات التالية تمثل درجات عينة من الطلاب في احد الاختبارات:

55	69	71	77	83	60	52	75	58	69
65	89	91	57	73	90	62	65	75	89
85	79	81	77	63	80	52	85	59	55
85	69	97	67	93	70	82	55	66	52
55	79	51	67	73	60	62	75	57	61

اعرض هذه البيانات في صورة جدول تكراري معتبرا أول فئة في الجدول على الصورة

( - 50) وطول الفئة = 10

س4/ الجدول التالي يمثل درجات عينة من الطلاب في احد الاختبارات:

المجموع	95-105	85 -	75 -	65 -	55 -	45 -	الفئات
100	12	20	؟	25	15	8	التكرار f
				70			x

أكمل الجدول السابق ، حيث x ترمز الى مركز الفئة.

س 5 / مستخدما الجدول التكراري السابق ، اوجد الجدول التكراري المتجمع الصاعد .

س 6 / مستخدما الجدول التكراري المتجمع الصاعد في التمرين السابق، ارسم المنحنى المتجمع الصاعد ، ثم استنتج منة قيمة الوسيط .

س 7 / الجدول التالي يبين توزيع الأوزان لعينة من الطلاب .

المجموع	80 -85	75 -	70 -	65 -	60 -	فئات الوزن
75	10	20	25	15	5	العدد f

المطلوب رسم المدرج التكراري ثم استنتج منة قيمة المنوال .

س 8 / مستخدما المدرج التكراري السابق ، وضح كيف يمكنك استنتاج المضلع التكراري ؟

س 9 / الجدول التالي يبين توزيع الأوزان لعينة من الطلاب .

المجموع	80 -90	75 -	70 -	65 -	60 -	فئات الوزن
90	15	20	35	15	5	العدد f
360	؟	؟	؟	60	20	جزء الدائرة

احسب قيمة الزاوية المناسبة لكل فئة من فئات الوزن في هذا الجدول .

س 11 / إذا كانت درجات عينة من الطلاب هي :

25 21 26 23 20 22 24 فان الوسيط = .....

س 12 / فيما يلي أعمار عينة من الموظفين ، احسب منها العمر الوسيط

21, 27, 37, 51, 33, 48, 41, 57, 23, 44, 55, 32

س 13 / إذا كانت درجات عينة من الطلاب هي :

25 26 21 27 23 20 22 24

فان المنوال = .....

س 14 / فيما يلي درجات عينة من الطلاب ، احسب منها قيمة المنوال .

25 21 20 21 27 21 21 20

س 15 / لديك الأرقام الآتية ، احسب قيمة الوسط الهندسي .

3 ، 5 ، 4 ، 1 ، 2


س 16 / احسب التباين من الأرقام الآتية :

3 ، 5 ، 4 ، 1 ، 2

س 17 / أوجد الانحراف المتوسط من الأرقام الآتية :

3 ، 5 ، 4 ، 1 ، 2

س 18 / الرسم التالي يمثل المنحنى المتجمع الصاعد لدرجات 30 طالب ، احسب من قيمة الوسيط .



س 19 / إذا كان الوسط الحسابي لدرجات الطلاب في مقرر النحو هو 77 بانحراف معياري 8

درجات ، فما هي قيمة معامل الاختلاف النسبي CV لهذا المقرر ؟

س 20 / حصل احد الطلاب في مقرر مبادئ الإحصاء على 85 ، فإذا علمت أن الوسط

الحسابي لدرجات الطلاب في مقرر مبادئ الإحصاء هو 80 بانحراف معياري 2.5

درجة ، فما هي قيمة المتغير المعياري Z لهذا المقرر ؟

س 21 / البيانات التالية تمثل أعمار عينة من الأطفال ، أوجد قيمة الوسط الهندسي G .

8 ، 5 ، 4 ، 6 ، 7 ، 2 ، 9

س 22 / البيانات التالية تمثل أعمار عينة من الأطفال ، أوجد قيمة الوسط التوافقي H .

4 , 5 , 2

س 23 / أوجد الوسط التوافقي من البيانات التالية :

9 , 8 , 3 , 7 , 4

س 24 / بفرض توفر البيانات التالية :  $n = 10$  ,  $\sum |x - \bar{x}| = 220$  ,  $\sum x = 30$

احسب قيمة الانحراف المتوسط .

س 25 / الجدول التالي يبين فئات درجات مادة مبادئ الإحصاء :

الدرجات (الفئات)	X مركز الفئة
15-	؟
25-	؟
35-	40
45-	50
55-65	60

اوجد المراكز المفقودة.

س 26 / الجدول التالي يبين توزيع درجات عينة من الطلاب في مادة مبادئ الإحصاء :

الدرجات (الفئات)	عدد الطلاب (التكرار) (f)	x	F x
25-	2	30	60
35-	5	40	200
45-	7	50	350
55-	5	60	300
65-	4	70	280
75-85	2	80	160
$\Sigma$	25	-----	1350

أوجد الوسط الحسابي .

س 27 / الجدول التالي يبين توزيع درجات عينة من الطلاب في مادة مبادئ الإحصاء :

الدرجات (الفئات)	عدد الطلاب (التكرار) (f)	الحدود العليا للفئات	التكرار المتجمع الصاعد
25 -35	5	أقل من 35	5
35 -45	12	(A) أقل من 45	17=f <sub>1</sub>
45 -55	15	أقل من 55	32=f <sub>2</sub>
55 -65	10	أقل من 65	42

65 -75	5	أقل من 75	47
75 -85	3	أقل من 85	50
$\Sigma$	50	-----	

أوجد قيمة الوسيط .

س 28 / الجدول التالي يبين توزيع درجات عينة من الطلاب في مادة مبادئ الإحصاء :

الدرجات (الفئات)	عدد الطلاب (التكرار) (f)
25-	5
35-	12=f <sub>1</sub>
45- A	15
55-	10=f <sub>2</sub>
65-	5
75-85	3
$\Sigma$	50

أوجد قيمة المنوال .

س 29 / الجدول التالي يبين توزيع الأجور اليومية لعينة من العمال :

فئات الأجر	65-	75-	85-	95-	105-115	$\Sigma$
عدد العمال	5	10	20	10	5	50

أوجد قيمة كل من : التباين والانحراف المعياري .

س 30 / الجدول التالي يبين توزيع الوزن بالكيلوجرام لعينة من الطلاب :

فئات الوزن	40-	50-	60-	70-	80-	90-100
عدد الطلاب	3	4	3	8	4	2

أوجد ما يلي :

1. الوسط الحسابي .
2. الانحراف المتوسط .

\*\*\*\*\*



س 12 / المدى = اكبر قيمة + اصغر قيمة .

أ : صح                      ب : خطأ

س 14 / شكل المضلع التكراري ينشأ من شكل المدرج التكراري :

أ : صح                      ب : خطأ

س 15 / شكل المدرج التكراري ينشأ من المنحنى المتجمع الصاعد :

أ : صح                      ب : خطأ

س 16 / الدائرة هي إحدى طرق العرض البياني للبيانات :

أ : صح                      ب : خطأ

س 17 / يتأثر الوسط الحسابي بالقيم الشاذة :

أ : صح                      ب : خطأ

س 18 / مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي = صفر

أ : صح                      ب : خطأ

س 19 / مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي = + 1

أ : صح                      ب : خطأ

س 20 / يتأثر الوسيط بالقيم الشاذة .

أ : صح                      ب : خطأ

س 21 / يمكن إيجاد الوسط الحسابي من البيانات الوصفية .

أ : صح                      ب : خطأ

س 22 / يستخدم الجدول التكراري في إيجاد :

أ : الوسط الحسابي                      ب : الوسيط                      ج : المنوال                      د : كل ما سبق

س 23 / يمكن أن يكون للبيانات أكثر من وسط حسابي .

أ : صح                      ب : خطأ

س 24 / يمكن أن يكون للبيانات أكثر من منوال .

أ : صح                      ب : خطأ

س 25 / أحيانا لا نجد منوال لبعض البيانات .

أ : صح                      ب : خطأ

س 26 / يمكن إيجاد الوسط الحسابي من الجداول التكرارية .

أ : صح                      ب : خطأ

س 27 / يمكن إيجاد الوسيط من المنحني المتجمع الصاعد .

أ : صح                      ب : خطأ

س 28 / مركز الفئة = ( الحد الأعلى للفئة + الحد الأدنى للفئة ) ÷ 2

أ : صح                      ب : خطأ

س 29 / مركز الفئة = ( الحد الأعلى للفئة - الحد الأدنى للفئة ) ÷ 2

أ : صح                      ب : خطأ

س 30 / التباين هو احد أنواع مقاييس المتوسطات .

أ : صح                      ب : خطأ

س 31 / يتأثر المنوال بالقيم الشاذة .

أ : صح                      ب : خطأ

س 32 / الانحراف المعياري هو : .....

أ : جذر التباين                      ب : جذر الوسط الحسابي                      ج : جذر الوسط الهندسي

س 33 / المنوال هو احد أنواع مقاييس: .....

أ : المتوسطات                      ب : التشتت                      ج : الارتباط

س 34 / يستخدم المدرج التكراري في إيجاد :

أ : الوسط الحسابي .                      ب : الوسيط .                      ج : المنوال

س 35 / يستخدم المنحني المتجمع الصاعد في إيجاد :

أ : الوسط الحسابي .                      ب : الوسيط .                      ج : المنوال

س 36 / يعتمد معامل الاختلاف النسبي CV على :

أ : الوسط الحسابي والتباين                      ب : الوسط الحسابي والانحراف المعياري



د: الوسيط والمنوال

ج: الوسط الحسابي والوسيط

س 37 / مقاييس التشتت هي :

أ: المدى      ب: الانحراف المتوسط      ج: التباين      د: كل ما سبق

س 37 مكرر / البيانات التالية تمثل الحالة الاجتماعية لعينة من الموظفين :

متزوج اعزب ارمل متزوج اعزب متزوج اعزب متزوج اعزب متزوج اعزب  
متزوج اعزب ارمل متزوج اعزب مطلق اعزب متزوج متزوج ارمل متزوج اعزب  
اعزب مطلق اعزب ارمل متزوج متزوج اعزب ارمل مطلق اعزب  
اعزب متزوج ارمل متزوج اعزب ارمل اعزب اعزب متزوج متزوج

ما هي قيمة التكرار النسبي للمتزوج ؟

أ: 0.35      ب: 0.31      ج: 0.75      د: 0.46

ما هي قيمة التكرار النسبي للأعزب ؟

أ: 20%      ب: 30%      ج: 40%      د: 47%

س 38 / البيانات التالية تمثل أعمار عينة من الموظفين :

33 , 27 , 20 , 36 , 34 , 25 , 22 ما هي قيمة الوسيط :.....

أ : 33      ب : 27      ج : 25

س 39 / البيانات التالية تمثل أعمار عينة من الموظفين :

29 , 30 , 21 , 33 , 27 , 20 , 36 , 34 , 25 , 22 ما هي قيمة الوسيط :.....

أ : 27      ب : 28      ج : 29

س 40 / البيانات التالية تمثل أعمار عينة من الموظفين :

33 , 27 , 20 , 35 , 34 , 25 , 22 ما هي قيمة الوسط الحسابي :.....

أ : 33      ب : 30      ج : 28

س 41 / البيانات التالية تمثل أعمار عينة من الموظفين :

25 , 34 , 25 , 33 , 27 , 25 , 36 , 34 , 25 , 21 ما هي قيمة المنوال :.....

أ : 34      ب : 30      ج : 25

س 42 / البيانات التالية تمثل أعمار عينة من الموظفين :

25 , 34 , 26 , 33 , 27 , 22 , 36 , 31 , 20 ، ما هي قيمة المنوال :.....

أ : لا يوجد منوال      ب : 30      ج : 28

س 43 / البيانات التالية تمثل أعمار عينة من الموظفين :

21 , 24 , 28 , 25 , 22 ما هي قيمة التباين :.....

أ : 4      ب : 6      ج : 8      د : 12

س 44 / البيانات التالية تمثل أعمار عينة من الموظفين :

21 , 24 , 28 , 25 , 22 ما هي قيمة الانحراف المتوسط :.....

أ : 2      ب : 0      ج : 4      د : 8

س 45 / بفرض حصولك علي النتائج التالية ، ما هي قيمة التباين  $S^2$  ؟

$$\sum f = 50 , \quad \sum (x - \bar{x})^2 = 150 , \quad \sum f(x - \bar{x})^2 = 200$$

أ : 3      ب : 4      ج : 5      د : 7

س 46 / بفرض حصولك علي النتائج التالية ، ما هي قيمة الانحراف المعياري S ؟

$$\sum f = 40 , \quad \sum (x - \bar{x})^2 = 120 , \quad \sum f(x - \bar{x})^2 = 160$$

أ : 4      ب : 3      ج : 2      د : 1

س 47 / بفرض حصولك علي النتائج التالية :  $n = 10$  ،  $\bar{x} = 6$  ، فما هي قيمة  $\sum x$  ؟

أ : 34      ب : 23      ج : 60      د : 72

س 48 / بفرض حصولك علي النتائج التالية ، فما هي قيمة الانحراف المتوسط ؟

$$\sum f = 50 , \quad \sum |x - \bar{x}| = 150 , \quad \sum f|x - \bar{x}| = 250$$

أ : 5      ب : 4      ج : 3      د : 2

س 49 / بفرض حصولك علي النتائج التالية ، فما هي قيمة الانحراف المتوسط ؟

$$n = 10 , \quad \sum |x - \bar{x}| = 50 , \quad \sum (x - \bar{x})^2 = 150$$

أ : 5      ب : 15      ج : 3      د : 10

س 50 / لديك الأرقام الآتية : 3 ، 5 ، 4 ، 1 ، 2

الوسط الهندسي = .....

أ : 3.4      ب : 2.6      ج : 1.1      د : 0.9

س 51 / لديك الأرقام الآتية : 7 , 2 , 5 , 3  
الوسط التوافقي = .....

أ : 3.4      ب : 5.8      ج : 7.5      د : 9.1

س 52 / القانون التالي :  $\frac{\sum f|x-\bar{x}|}{\sum f}$  هو قانون :

أ : الانحراف المعياري .      ب : الانحراف المتوسط .      ج : الوسط التوافقي .

س 53 / القانون التالي :  $\frac{\sum f(x-\bar{x})^2}{\sum f}$  هو قانون :

أ : الانحراف المعياري .      ب : الانحراف المتوسط .      ج : التباين .

س 54 / قانون المتغير المعياري z هو :

أ :  $z = \frac{x-\bar{x}}{s}$  ،      ب :  $z = \frac{x+\bar{x}}{s}$  ،      ج :  $z = \frac{x \times \bar{x}}{s}$

س 55 / قانون معامل الاختلاف النسبي C.V هو :

أ :  $C.V = \frac{\bar{x}}{s}$  ،      ب :  $C.V = \frac{s}{\bar{x}}$  ،      ج :  $C.V = \bar{x} \times s$

س 56 / من خصائص الوسط الحسابي :

أ : تدخل كل القيم في حسابه .      ب : يمكن إيجاده بيانياً .      ج : لا يتأثر بالقيم الشاذة .


س 57 / من خصائص الوسيط :

أ : تدخل كل القيم في حسابه .      ب : لا يتأثر بالقيم الشاذة .      ج : لا يمكن حسابه بيانياً .

س 58 / فيما يلي المنحنى المتجمع الصاعد لدرجات 40 طالب في مقرر الإحصاء .

من الرسم ما هي قيمة الوسيط ؟

أ : 20      ب : 22      ج : 24      د : 26



س 59 / الجدول التالي يبين درجات احد الطلبة في عدة مواد بجانب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل مادة .

المادة	الدرجة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري
النظم	50	60	8
التاريخ	80	75	4
الجغرافيا	60	65	2

من الجدول السابق :

1- معامل الاختلاف النسبي لمادة التاريخ يساوي :

أ : 2.55      ب : 5.33      ج : 7.35

2- المتغير المعياري لمادة النظم يساوي :

أ : 1.5      ب : 3      ج : -1.25

س 60 / أوجد الوسط الحسابي من الجدول التكراري التالي والذي يبين توزيع الأوزان لعينة من الطلاب .

فئات الوزن	60-	64-	68-	72-	76-	80-	84-88	Σ
العدد f	5	12	20	26	20	12	5	100

أ : 77      ب : 74      ج : 80      د : 79

س 61 / الجدول التكراري التالي يبين توزيع الأوزان لعينة من الطلاب . أوجد الوسيط .

فئات الوزن	60-	64-	68-	72-	76-	80-	84-88	$\Sigma$
العدد f	5	12	20	26	20	12	5	100

أ : 74      ب : 76      ج : 78      د : 80

س62 / الجدول التكراري التالي يبين توزيع الأوزان لعينة من الطلاب . أوجد المنوال .

فئات الوزن	60-	64-	68-	72-	76-	80-	84-88
عدد الطلبة	5	12	20	26	20	12	5

أ : 68      ب : 70      ج : 72      د : 74

س63 / الجدول التكراري التالي يبين توزيع الأوزان لعينة من الطلاب .

فئات الوزن	60-	64-	68-	72-	76-	80-	84-88	$\Sigma$
العدد f	5	12	20	26	20	12	5	100

وعلي فرض أن الوسط الحسابي = 74 ، فإن التباين = .....

أ : 44.2      ب : 48.2      ج : 36.16      د : 50.2

س 64 / أوجد المنوال من الجدول التالي والذي يمثل توزيع الدرجات في احد الاختبارات.

الدرجات	30-	40-	50-	60-	70-	80-	90-100
عدد الطلبة	1	4	10	15	10	7	3

أ : 65      ب : 77      ج : 60      د : 75

س 65 / أوجد الوسط الحسابي من بيانات الجدول السابق مباشرة:

أ : 61.7      ب : 65      ج : 67.4      د : 73.1

س 66 / من السؤال السابق مباشرة ، أوجد قيمة الوسيط .

أ : 65      ب : 63.8      ج : 69.2      د : 66.67

س 67 / الجدول التالي يمثل توزيع الدرجات في احد الاختبارات لمجموعة من الطلاب:

الدرجات	30-	40-	50-	60-	70-	80-	90-100
عدد الطلبة	2	5	8	15	8	5	2

وعلي فرض ان الوسط الحسابي = 65 ، فان التباين : .....

أ : 210      ب : 180      ج : 250.44      د : 204.44

س 68 / من السؤال السابق مباشرة ، وعلي فرض أن الوسط الحسابي = 65 ، فان الانحراف المتوسط = .....

أ : 10.55      ب : 10.67      ج : 12.88